

Lane Medical Libr.

1884

Analyse septisch inficirten Hundeblyutes.

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung des Grades eines

Doctors der Medicin

verfasst und mit Bewilligung

Einer Hochverordneten Medicinischen Facultät der Kaiserl.
Universität zu Dorpat

zur öffentlichen Vertheidigung bestimmt

von

Fedor Kupffer,

Curonus.

Ordentliche Opponenten:

Prof. Dr. A. Vogel. — Prof. Dr. L. Stieda. — Prof. Dr. A. Schmidt.

Dorpat.

Druck von H. Laakmann's Buch- und Steindruckerei.

1884.

Gedruckt mit Genehmigung der medicinischen Facultät.

Dorpat, den 21. November 1884.

Nr. 528.

Decan: Stieda.

Dem Fräulein

Adolphine von Brödrich

auf Kurmahlen

in Dankbarkeit

der Verfasser.

Meinen wärmsten Dank sage ich allen meinen hochverehrten Lehrern beim Scheiden von dieser Hochschule.

Insbesondere aber danke ich Herrn Professor Dr. A. Schmidt für die mir in liebenswürdigster Weise geleistete Unterstützung bei dieser Arbeit.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

In meinen nachfolgenden Versuchen habe ich zunächst den Zweck verfolgt die von v. Goetschel zur Analyse gefunden und septisch inficirten Schafblutes benutzte Methode auch auf das Hundeblut anzuwenden.

v. Goetschel ermittelte bei dem defibrinirten Schafblute zunächst folgende Werthe:

1. Den prozentischen Trockenrückstand des ganzen Blutes (T).
2. Den prozentischen Trockenrückstand des Blutserums (t).
3. Den prozentischen Trockenrückstand der rothen Blutkörperchen bezogen auf das ganze defibrinirte Blut (r).
4. Den Extinctionscoefficienten des Blutes (ϵ).
5. Das spezifische Gewicht des Blutes.

Waren die drei erstgenannten Werthe ermittelt, so fand v. Goetschel:

1. Das prozentische Gewicht der rothen Blutkörperchen (b) nach der Formel $b = \frac{100 (t + r - T)}{t}$ und

2. Den prozentischen Trockenrückstand der rothen Blutkörperchen bezogen auf diese selbst (R) nach der Formel $R = \frac{rt}{t + r - T} = \frac{100 r}{b}$

3. Den Serumrückstand in 100 gr. Blut (t')

$$t' = \frac{(100 - b) t}{100}$$

Da der Hämoglobingehalt des Blutes dem Exstinctionscoefficienten direkt proportional ist, so ergab sich aus der Vergleichung dieses Werthes mit den gefundenen Werthen von r unmittelbar, ob bei den durch septische Infektion herbeigeführten und aus b und R zu ersehenden Aenderungen in der Menge und Concentration der rothen Blutkörperchen das ursprüngliche Verhältniß zwischen Hämoglobin und Stroma unverändert blieb, oder ob und in welcher Richtung in dieser Hinsicht Störungen eingetreten waren.

Zur Controlle der analytischen Ergebnisse dienten die spez. Gewichtsbestimmungen des Blutes. Es zeigte sich hierbei, daß, obgleich natürlich alle Bestandtheile des Blutes das spezifische Gewicht beeinflussen, doch das Hämoglobin den bei weitem größten Einfluß ausübt, so daß der Exstinctionscoefficient, beziehungsweise der Hämoglobingehalt des Blutes und das spezifische Gewicht desselben sich fast stets in gleichem Sinne änderten, was durchaus nicht immer von den übrigen Blutbestandtheilen (Stroma und Serumrückstand) gilt.

Da es aber v. Goetschel nicht gelang das Schafhämoglobin krySTALLINISCH darzustellen, so mußte er auf die Ermittlung des betreffenden Absorptionsverhältnisses verzichten und damit zugleich auf die Feststellung absoluter Zahlen für den Hämoglobin = resp. den Stromagehalt des Blutes resp. der rothen Blutkörperchen. Diesen Mangel wollte ich beseitigen, indem ich zu meinen Versuchen das so leicht krySTALLISIRENDE Hundeblood wählte. Ich hatte also zunächst das Absorptionsverhältniß des Hundebloodes mit den im hiesigen physiologischen Institut befindlichen Hüfnerschen Spectrophotometer zu bestimmen; im übrigen lag es mir ob ganz nach v. Goetschel zu verfahren auf dessen Darstellung der Versuchsmethode ich deshalb verweisen muß.

I. Ueber einige Fehlerquellen der Methode.

Bevor ich an meine eigentliche Aufgabe schritt, versuchte ich über einen Punkt zur Klarheit zu kommen, der schon v. Goetschel viel zu schaffen gemacht hat. Es ist nämlich ohne weiteres klar, daß der prozentische Rückstand des ungeronnenen Blutes, welchen ich von jetzt ab der Kürze halber als Gesamtblut bezeichnen will, größer sein muß, als der des defibrinirten Blutes und zwar um das Faserstoffprozent größer, oder anders ausgedrückt, der prozentische Rückstand des defibrinirten Blutes (T) muß gleich sein demjenigen des Gesamtblutes (T') minus dem Faserstoffprozent (f).

v. Goetschel fand nun, daß die wirklich erhaltenen Wägungsergebnisse niemals dieser Forderung entsprachen, insofern T immer größer und zwar beträchtlich größer gefunden wurde als $T' - f$, ja häufig sogar größer als T' selbst, und auch ich bin in der Lage, diese Angabe als eine ausnahmslos richtige zu bestätigen.

Es fragt sich nun, ob bei aller Anerkennung der theoretischen Richtigkeit der Gleichung $T = T' - f$ nicht in Praxi Dinge eintreten, welche ihre Geltung in dem bereits angegebenen Sinne aufheben.

v. Goetschel's und mein Verfahren bestand in Folgendem:

Es wurde eine größere Menge Blutes (30—40 Ccm.) durch Umrühren mit einem Fischbeinstäbchen defibrinirt,

dann das Faserstoffklümpchen vom Stäbchen in das Blut zurückgebracht, mit demselben gewogen, dann mit dem Stäbchen herausgefischt, durch Pressen zwischen Daumen und Zeigefinger vom eingeschlossenen Blute möglichst befreit, wobei das letztere in den Gesamtvorrath zurücktropfte, und nun erst das Auswaschen des Faserstoffes mit destillirtem Wasser begonnen, worauf Trocknen und Wägen folgte. Vom Gesamtvorrath des Blutes wurden nun auch, nach ein paar-maligem Umrühren 5—6 grm. zur Bestimmung von T abgewogen und aufs Dampfbad zum Trocknen gelegt.

Nun ist klar, daß der Faserstoff trotz des Auspressens doch immer eine gewisse Menge eingeschlossenen Blutes mit fortnimmt. In dieser Hinsicht sind aber nur drei Fälle möglich: entweder nämlich hat das im Faserstoff eingeschlossen gebliebene defibrirte Blut dieselbe Zusammensetzung in Betreff des Verhältnisses zwischen Blutkörperchen und Serum, wie das im Glase zurückgebliebene; dann hat dieser Verlust gar keinen Einfluß auf die Rückstandsziffer des defibrirten Blutes, d. h. unter allen Umständen muß dann $T = T' - f$ sein.

Oder der Faserstoff hält relativ mehr rothe Blutkörperchen, als Blutserum zurück; dann hat der Gesamtvorrath einen relativ größeren Verlust an den schwereren Bestandtheilen verloren und T muß sogar kleiner als $T' - f$ sein.

Oder endlich der ausgepresste Faserstoff hat relativ mehr Serum, als Blutkörperchen mit sich genommen, so daß im Gesamtvorrath das ursprüngliche Verhältniß zwischen beiden zu Gunsten des letzteren gestört worden ist. In diesem einzigen Falle könnte also T größer sein als $T' - f$. Dieser Fall aber scheint auf den ersten Blick sehr unwahrscheinlich zu sein, da nach den bisherigen Erfahrungen zu urtheilen, der Faserstoff vielmehr die Neigung zu besitzen

scheint, die Blutkörperchen in sich einzuschließen und die Blutflüssigkeit auszustoßen. Ich komme auf diesen Fall später zurück.

Eine weitere Fehlerquelle kann in dem Umstande gesucht werden, dass der ausgewaschene und getrocknete Faserstoff niemals ganz rein ist, weil er stets die unlöslichen Reste eingeschlossener körperlicher Elemente, farblose und rothe Blutkörperchen enthält; hiernach würde f immergrößer sein, als sein wahrer Werth, also $T' - f$ immer zu klein, also auch kleiner als T ausfallen.

Wir wollen in dieser Hinsicht zuerst die vom Faserstoff eingeschlossenen farblosen Blutkörperchen betrachten. Sehen wir hierbei ganz von dem Umstande ab, daß gewisse Bestandtheile des größeren Theiles dieser Elemente, indem sie zu Grunde gehen, zur Faserstoffbildung beitragen, d. h. in die Substanz des Faserstoffes ganz übergehen, die deshalb also auch garnicht in Betracht kommen, sondern betrachten wir nur die als solche eingeschlossenen farblosen Blutkörperchen und zwar als etwas dem Faserstoff ganz fremdes, deren trockne Residuen das Faserstoffgewicht zu hoch und eben deshalb die Differenz $T' - f$ zu klein ausfallen lassen, so ist zu bedenken, daß diese Residuen, indem sie mit den farblosen Blutkörperchen vom Faserstoff eingeschlossen wurden, ja zugleich auch dem Trockenrückstande des defibrinirten Blutes verloren gingen, so daß auch dieser um denselben Werth zu klein ausfallen muß. Wären sie nicht vom Faserstoff eingeschlossen worden, so wären sie eben im defibrinirten Blute geblieben; der Werth $T' - f$ wäre dann allerdings größer ausgefallen, als wir ihn faktisch gefunden, ebenso aber auch der Werth T . Dieser Fehler würde sich vollkommen von selbst eliminiren, wenn der gesammte feste Rückstand der vom Faserstoff eingeschlossenen farblosen

Elemente, auch noch im ausgewaschenen getrockneten Faserstoff enthalten wäre. Dies ist aber nicht der Fall, da wir mit Sicherheit annehmen können, daß die löslichen Bestandtheile dieser Elemente beim Auswaschen des Faserstoffes mit dem Waschwasser extrahirt worden sind. Mithin ist der Gewichtsverlust, welchen der Trockenrückstand des defibrinirten Blutes durch mechanische Einschließung der farblosen Elemente, seitens des Faserstoffes erleidet, größer als der Gewichts z u w a c h s , welchen der Faserstoff aus ebendemselben Grunde erfährt, d. h. T kann, sofern dieser Umstand überhaupt in Betracht kommt, immer nur kleiner, niemals aber wie wir es doch stets gefunden haben, größer ausfallen als $T' - f$.

Anders steht es mit den vom ausgewaschenen und getrockneten Faserstoff eingeschlossenen unlöslichen Bestandtheilen des Stroma der rothen Blutkörperchen. Wir wollen, um die Bedeutung dieses Fehlers zu erkennen uns vorstellen, daß keine andere Fehlerquelle existirt, insbesondere wollen wir von der Annahme ausgehen, daß das im Faserstoff, nach dem Auspressen zurückbleibende Blut Blutkörperchen und Serum in demselben Verhältniß enthält, wie das übrige Blut. In diesem Falle wird durch den Verlust, welchen die Gesamtmenge des defibrinirten Blutes auf diese Weise durch den Faserstoff erleidet, die Rückstandsziffer des ersten nicht alterirt, aber während die Serumbestandtheile aus dem Faserstoff durch Auswaschen ganz entfernt werden, bleibt ein Theil der Stromabestandtheile der rothen Blutkörperchen darin zurück, erhöht das Fibringewicht und verkleinert demnach den Werth der Differenz $T' - f$. Hier macht sich also wirklich ein Fehler geltend, welcher in der Richtung der von v. Göttschel und mir gemachten Erfahrung einwirkt. Indem ich mir aber vorbehalte auf die Be-

stimmung der maximalen Gröfse dieses Fehlers zurückzukommen, will ich hier nur bemerken, dafs der Faserstoff durch die eingeschlossenen unlöslichen Stromabestandtheile ja nur einen Gewichtszuwachs erfährt; denkt man sich denselben weg, so bleibt doch immer noch das Gewicht des Faserstoffes selbst übrig, und dieses Gewicht müfste dann doch vom Rückstande des Gesamtblutes abgezogen werden, um dasselbe demjenigen des defibrinirten Blutes gleichzumachen. Der erwähnte Fehler kann demnach wohl bewirken, dafs T gröfser ist als $T' - f$, aber er kann niemals bewirken, dafs T gleich T' oder gar, wie v. Göttschel und ich es doch mehrfach gefunden, gröfser als T' wird.

Die von v. Göttschel angewandte Methode ermöglicht es mehrere vergleichende Analysen des Blutes im Laufe von nur 2 bis 3 Wochen gleichzeitig auszuführen. Ich meine deshalb, dafs es sich der Mühe lohnt, etwaige Unsicherheiten derselben zu beseitigen. Eine solche Unsicherheit haftet ihr aber wegen der faktischen Ungleichheit der Werthe T u. $T' - f$ an; man weifs nicht welchen von diesen beiden Werthen man als den richtigeren für den Rückstand des defibrinirten Blutes in die obige Formel einführen soll. Und doch wird man fast immer sich an das defibrinirte Blut halten müssen, denn die Ausführung der Untersuchung von ungeronnenem Blute verlangt die Bestimmung des Plasmarückstandes, statt des bisher benutzten Serumrückstandes; mit Ausnahme des Pferdeblutes sind aber die meisten zu solchen Versuchen verwendbaren Blutarten zur Plasmagewinnung nicht geeignet und septische Infectionsversuche wird man doch gewöhnlich bei kleineren Thieren, Hunden, Schafen und dergl. anstellen.

v. Göttschel, welcher den durch die eingeschlossenen unlöslichen Stromabestandtheile bedingten Fehler des Faser-

stoffprozentos für zu klein hielt, als daß er berücksichtigt zu werden verdiente, nahm an, daß das Blut während des Defibrinirens im offenen Glase einen Gewichtsverlust durch Wasserverdunstung erlitten hatte, und daß deshalb der Rückstand des defibrinirten Blutes stets ein zu hohes Gewicht ergeben habe; als richtiger Werth für diesen Rückstand galt ihm der Rückstand des Gesamtblutes minus dem trockenen Faserstoff; diese beiden Gröſsen hat er demnach stets bestimmt, den ersteren bei möglichster Vermeidung jeden Wasserverlustes. Nun diente ihm aber ebendasselbe defibrinirte und dadurch gemäß der Annahme concentrirter gewordene Blut auch zur Ermittlung des Rückstandes der rothen Blutkörperchen in 100 grm. Blut (r). Auch dieser Werth mußte dann in demselben Maasse zu hoch ausfallen wie der Werth von T. v. G ö t f c h e l corrigirte ihn darnach durch eine einfache Proportionsrechnung $T : (T' - f) = r : x$. Dieser Correctur wegen sah er sich genöthigt auch jedes mal den faktischen Rückstand des defibrinirten Blutes (T) durch direkte Wägung zu bestimmen. Nur der durch Wägung ermittelte Rückstand des Serums kam ohne Correctur in Anwendung, da bei Gewinnung des letzteren von keinem irgend erheblichen Wasserverlust die Rede sein konnte.

Ich gestehe jedoch, daß mir v. Goetſchels Annahme nicht ganz wahrscheinlich erschien. Unter der Voraussetzung ihrer Richtigkeit läßt sich nämlich aus den Goetſchelschen Daten der Wasserverlust, der beim Defibriniren des Blutes stattfindet, leicht berechnen. Nennen wir den prozentischen Wasserverlust w , so ist offenbar

$$w = 100 - \frac{100 (T' - f)}{T}.$$

Führt man nun diese Rechnung nach den v. Goetſchelschen Versuchen aus, so erhält man unwahrscheinlich

hohe Zahlen für den Wasserverlust beim Defibriniren, Zahlen die in einzelnen Fällen nahezu 3 % des Blutgewichtes betragen, dabei dauerte das Defibriniren in v. Goetschels und meinen Versuchen nur ca. 10 Minuten, oft gelang es noch schneller das Blut zu defibriniren. Es ist kaum glaublich, daß in so kurzer Zeit der Verdunstungsfehler zu solcher Höhe anwachsen sollte, und zwar bei Blutmengen von ca. 30 Ccm. Ich habe deshalb einige Versuche angestellt, um den tatsächlichen, durch das Defibriniren bewirkten Verdunstungsfehler zu bestimmen.

Bevor ich jedoch auf diese Fehler übergehe, stelle ich des Ueberblickes wegen, die betreffenden Zahlen aus v. Goetschel's und meinen Versuchen zusammen. Die Tabellen enthalten demnach die Zahlen: 1) Für den Rückstand des Gesamtblutes (T'). 2) Für den trockenen Faserstoff (1). 3) Für den durch Wägen gefundenen Rückstand des defibrinirten Blutes (T). 4) Für die Differenz $T' - f$ als berechneten Rückstand des defibrinirten Blutes. 5) Für die Differenz zwischen dem durch Wägung gefundenen und berechneten Rückstand des defibrinirten Blutes [$T - (T' - f)$] und endlich 6) für den aus den Werthen T und $T' - f$ zu berechnenden Wasserverlust. Sämmtliche Zahlen beziehen sich auf 100 grm. Blut.

Man ersieht aus diesen Tabellen, daß in keinem einzigen Falle auch nur eine annähernde Gleichheit zwischen den Zahlen $T' - f$ und T besteht, so zwar, daß die Differenz $T - (T' - f)$ ausnahmslos positiv ausfällt. Häufig ist T fogar größer als T' an und für sich und zwar beim Hundeblood in allen Fällen.

Die in der ersten Tabelle enthaltenen Rubriken sind v. Goetschel's Versuchen, welche Schafsblut betrafen

entnommen; die beiden folgenden gehören mir selbst an und betreffen das Hunde- und Pferdeblut.

v. Goetschel hat seine Versuche an 5 Schafen angestellt, jedem derselben wurden 3 Blutproben abgenommen, die erste vom gefundenen Thier, die beiden spätern nach stattgehabter Jaucheinjection, im Ganzen also 15. In die nachfolgende erste Tabelle nehme ich indess nur die Zahlen für das gesunde Blut auf, sodafs dieselbe 5 Nummern enthält. Die 10 übrigen Nummern lasse ich aus, weil sie ausnahmslos ganz dasselbe beweisen, wie die das gesunde Blut betreffenden Zahlen. Ja die grössten Differenzen zwischen T und T' — f fallen gerade auf die Proben des kranken Blutes, so dafs eben diese Proben die Fälle darstellen, in welchen die Verdunstungsfehler beim Defibriniren nahezu 3 % des Blutgewichtes erreicht haben mußten. Die zweite und dritte Tabelle bezieht sich auf meine eigenen Versuche mit resp. Hunde- und Pferdeblut. Hund 1 und 2 sind dieselben, an welchen ich die später zu erwähnenden methodischen Versuche in dem v. Goetschel'schen Sinne anstellte. In meine Tabellen nehme ich sowol die Zahlen für die vor als auch für die beiden nach der Injection dem Thiere entnommenen Blutproben auf. Die erstere ist mit a, die beiden letzteren mit b und c bezeichnet.

Ich lasse jetzt die Tabellen folgen:

Tabelle I. Schafsblut (v. G ö t s c h e l).

Nummer des Thieres.	Rückstand des Ge- sammtblutes (T').	Faser- stoff (f).	Rückstand des defi- brinirten Blutes (T.)	T' — f.	T — (T' — f)	Berechneter Wasser- verlust.
I.	17,112	0,377	17,049	16,735	+ 0,314	1,87
II.	15,133	0,230	15,049	14,903	+ 0,146	0,97
III.	16,593	0,169	16,542	16,424	+ 0,118	0,71
IV.	18,049	0,342	18,107	17,707	+ 0,400	2,21
V.	16,840	0,263	16,788	16,577	+ 0,211	1,25

Tabelle II. Hundeblut (mein Versuch).

Nummer des Thieres.		Rückstand des Ge- sammtblutes (T').	Faser- stoff (f).	Rückstand des defi- brinirten Blutes (T).	$T' - f.$	$T - (T' - f.)$	Berechneter Wasser- verlust.
I.	a	21,688	0,104	21,939	21,584	+ 0,355	1,62
	b	21,016	0,096	21,171	20,920	+ 0,251	1,19
	c	20,394	0,247	20,548	20,147	+ 0,401	1,95
II.	a	18,799	0,297	18,898	18,502	+ 0,396	2,10
	b	19,295	0,193	19,381	19,102	+ 0,279	1,44
	c	17,749	0,324	17,814	17,425	+ 0,389	2,18
III.		21,525	0,223	21,693	21,302	+ 0,391	1,80

Tabelle III. Pferdeblut (mein Versuch).

Nummer des Thieres.		Rückstand des Ge- sammtblutes (T').	Faser- stoff (f).	Rückstand des defi- brinirten Blutes (T).	$T' - f.$	$T - (T' - f.)$	Berechneter Wasser- verlust.
I.		17,259	0,220	17,385	17,039	+ 0,346	1,99
II.		15,176	0,264	15,148	14,912	+ 0,236	1,56
III.		17,436	0,297	17,412	17,139	+ 0,273	1,57
IV.		17,753	0,377	17,640	17,376	+ 0,264	1,50

Im Hinblick auf die in diesen Tabellen niedergelegten Beobachtungen, will ich nur noch bemerken, daß ich ebenso, wie v. Göttschel das Trocknen der Rückstände bis zum Eintritt absoluter Gewichtsconstanz fortgesetzt habe, so weit sie mit einer Wage, welche noch für die vierte Decimalstelle deutliche Ausschläge gab, erreicht werden konnte. Von einem Wägungsfehler als Ursache der von uns gefundenen constanten Differenz zwischen T u. $T' - f$ kann also nicht die Rede sein; es wäre auch höchst merkwürdig, wenn dieser Fehler immer nur auf die eine Seite gefallen wäre. Ferner hebe ich noch hervor, daß der Faserstoff stets bis zur vollkommenen Weise ausgewaschen wurde, was bei dem ausgeschlagenen Faserstoff bekanntlich sehr leicht und schnell von statten geht. Zur Entfernung

des etwa eingeschlossenen Paraglobulins wurde der Faferstoff auch mit einer Kochfalzlöfung von 2—3 % und darauf natürlich wieder mit Waffer gewafchen, bis zur völligen Entfernung des ClNa .

Es fragt fih nun ob man berechtigt ift die Nichtübereinstimmung zwifchen den Gröfsen T u. $T' - f$ blos auf die Verdunstung beim Defibriniren zu beziehen, d. h. ob der thatfächliche Wafferverluft beim Defibriniren, dem von uns berechneten wirklich gleichkommt. Zu diefem Behufe beftimmte ich den thatfächlichen Verdunstungsfehler, in dem ich das Blut vor und nach dem Umrühren wog. Mit Ausnahme des Pferdeblutes können folche Verfuche aus naheliegenden Gründen nur an bereits defibrinirtem Blute angeftellt werden. Da das Herausnehmen des Fifchbeinftäbchens nach beendigtem Umrühren des Blutes einen Fehler bedingt hätte, fo war daffelbe fowohl bei der Wägung des leeren, als des mit Blut befchickten Glafes mitgewogen worden. Die Länge des Stäbchens war geringer, als die Höhe des Glafes, fo dafs es die Bedeckung mit dem Uhrfchälchen während des Wägens nicht hinderte.

Die Blutmenge betrug 10 bis 30 Ccm., darnach wählte ich die Gläfer fo, dafs zwifchen freier Oberfläche und Maffe der Flüssigkeit ftets annähernd das gleiche Verhältnifs herrfchte, d. h. die Flüssigkeitfcylinder waren von ähnlicher Gefalt. Die Verfuchserefultate ergeben fih aus folgendem:

Verfuch I. Defibrinirtes Hundeblut von Zimmertemperatur wird gewogen, 20 Minuten lang umgerührt, dann wieder gewogen. Der Gewichtsverluft beträgt 0,25 % des Blutgewichtes.

Verfuch II. Gekühltes ungeronnenes Pferdeblut wird gewogen, darauf 10 Minuten lang umgerührt, wobei der Fa-

ferstoff sich ausschied, und wieder gewogen. Der Gewichtsverlust beträgt 0,07 %.

Versuch III. Gekühltes Blutplasma vom Pferde wird im Zimmer bis nahe zur Zimmertemperatur erwärmt, gewogen, 20 Minuten lang umgerührt, wobei der Faserstoff sich ausschied und wieder gewogen. Der Gewichtsverlust beträgt 0,24 %.

Man sieht wie klein der Verdunstungsfehler ausfällt, selbst in den Fällen, in welchen das Umrühren 20 Minuten gedauert hatte; zugleich sieht man von welchem Einfluss die Temperatur des Blutes auf die Verdunstung ist. Eben aus diesem Grunde sind die bisherigen Versuche nicht maßgebend für uns, denn in denselben besaß das Blut von vorne herein nur die Temperatur des Zimmers, oder wie in Versuch II und III sogar eine noch bedeutend niedrigere. In v. Goetschel's und meinen Versuchen aber, auf welche sich die Zahlen in vorstehenden drei Tabellen beziehen, wurde das unmittelbar der Ader entnommene körperwarmer Blut sofort defibrinirt, wobei die Bluttemperatur in absteigender Linie sich der Zimmertemperatur nähern mußte. Um diese Verhältnisse nachzuahmen, wurde das mit der erforderlichen Menge Blut beschickte Glas nach der ersten Wägung in Wasser von 40° getaucht, 10 Minuten lang unter fortwährendem Umrühren darin gehalten, dann herausgehoben, noch weitere 10 Minuten in der warmen Hand umgerührt, von Aussen gut abgetrocknet und wieder gewogen. Um die Erwärmung auf 40° rasch herbeizuführen, nahm ich zu diesen Versuchen kleine Blutmengen (10 Ccm.) und entsprechend kleine Gläser.

Versuch IV. Defibrinirtes Hundeblut 20 Minuten lang umgerührt, Gewichtsverlust beträgt 0,51 %.

Versuch V. Defibrinirtes Pferdeblut 20 Min. lang umgerührt, der Gewichtsverlust beträgt 0,51 %.

Verfuch VI. Ungeronnenes Pferdeblut 20 Min. lang umgerührt, der Gewichtsverlust beträgt 0,41 ‰.

Verfuch VII. Defibrinirtes Hundeblut. In diesem Verfuch wurde das Blut zuerst auf 40° erwärmt, dann das Thermometer herausgenommen, rafch gewogen und nun nur 10 Minuten lang umgerührt. Der Gewichtsverlust beträgt 0,34 ‰.

Man fieht, dafs ein durch die Wage bestimmbarer Wafferverluft überall stattgefunden hat, aber derfelbe ift, felbft nach 20 Minuten langem Umrühren fehr klein, verglichen mit den im letzten Stabe unferer Tabellen angegebenen, aus T und T' — f berechneten Verluften. Die in dem Verfuch VII, in welchem das Umrühren 10 Minuten dauerte, ermittelte Zahl (0,34 ‰) wird wol annähernd auch der Ausdruck fein für den Wafferverluft, den unfere Blutproben beim Defibriniren erlitten hatten. Wenn hierdurch auch die Rückftandsziffer des defibrinirten Blutes beeinflusst werden mußte, fo kann diefer Einfluß doch nur ein fehr geringer gewesen fein und die grofsen von uns beobachteten Differenzen zwischen T und T' — f können unmöglich allein von der Verdunstung beim Defibriniren abgeleitet werden. Man hat fich demnach nach anderen mitwirkenden Urfachen umzusehen.

Ich dachte nun an die bereits erwähnte Möglichkeit, dafs der ausgefchlagene und darauf zwischen den Fingern geprefte Faferstoff Blutkörperchen und Blutferum in einem andern, als dem im Blute gegebenen Verhältniffe, einfchließt. Soll aber hierdurch die Rückftandsziffer des defibrinirten Blutes erhöht werden, fo kann dies nur unter der Vorausfetzung gefchehen, dafs der ausgefchlagene und dann geprefte Faferstoff ein ferumreicheres resp. körperchenärmeres Blut einfchließt; es wäre denkbar, dafs der ausgefchlagene Faferstoff von vorneherein, während feiner

Entstehung, Blut von dieser abweichenden Zusammensetzung einschließt; ebenso aber auch, daß während des Pressens die Blutkörperchen leicht herauschlüpfen, während eine gewisse Quantität Serum mit großer Kraft zurückgehalten wird.

Die zur Entscheidung dieser Frage angestellten Versuche bestanden in Folgendem: Etwa 50—60 Ccm. Blut wurden gleich nach dem Auffangen aus der vena jugularis ext. zu ungefähr gleichen Theilen in zwei Gläser vertheilt, aus dem einen sofort 5—6 grm. zur Bestimmung des Rückstandes (T') in einen Platintiegel übergeführt und gewogen. Der Rest, sowie das Blut im zweiten Glase, wurden während dieser Wägung wie gewöhnlich defibrinirt, dann beide getrennt mit dem Faferstoff gewogen. Der Faferstoff aus dem ersten Glase wurde, nachdem er zwischen den Fingern gepreßt worden, bis kein Blut mehr abtropfte, zum Auswaschen bei Seite gelegt; er diente zur Ermittlung des Faferstoffprozentos. Der Faferstoff aus dem zweiten Glase wurde, nachdem er ebenso gepreßt worden in einem Platintiegel, so wie er war, als feuchter Faferstoff, gewogen, bis zur Gewichtsconstanz getrocknet und wieder gewogen. Das in den beiden Gläsern zurückbleibende Blut wurde zusammengegossen, ein paar Mal umgerührt und 5—6 grm. davon in einem Platintiegel zur Bestimmung des Rückstandes T abgewogen.

Nennen wir das prozentische Gewicht des reinen getrockneten Faferstoffes wie gewöhnlich f , das des feuchten bluthaltigen F und endlich desjenigen des Trockenrückstandes von letzterem F' , so ist offenbar $F - f$ das Gewicht des vom Faferstoff eingeschlossenen Blutes und $F' - f$ das Rückstandsgewicht dieses Blutes. Ausserdem disponirte ich noch über die Werthe T' , T und $T' - f$. Es war aber nun leicht festzustellen, ob der prozentische Rückstand des vom Faferstoff eingeschlossenen Blutes demjenigen des ursprünglichen

Blutes minus dem Faferstoff, nämlich $T' - f$, gleich war. Dies war, wie aus folgenden Verſuchen hervorgeht, nicht der Fall.

Verſuch I. Hundeblut (cf. Tab. II Nr. III).

Auf 100 gr. bezogen erhielt ich:

Feuchten, bluthaltigen Faferſtoff 2,225 gr.; denſelben getrocknet 0,486 grm., reinen trocknen Faferſtoff 0,223 gr. Die vom Faferſtoff eingefchloſſene Blutmenge betrug demnach $2,225 - 0,223 = 2,002$, der Rückſtand dieſes Blutes $= 0,486 - 0,223 = 0,263$ grm.

2,002 grm. vom Faferſtoff eingefchloſſenen Blutes hinterließen demnach einen Rückſtand von 0,263 grm. macht 13,237 %. Der Rückſtand des Geſammtblutes minus dem Faferſtoff aber betrug $21,525 - 0,223 \% = 21,302 \%$ d. h. alſo der Faferſtoff hatte ein ſehr körperchenarmes Blut eingefchloſſen.

Es erhebt ſich nun die Frage, ob durch dieſen Umſtand die ganze in der Tabelle angegebene Differenz zwiſchen T ($= 21,693$) und $T' - f$ ($= 21,302$) bewirkt ſein kann. Iſt dem ſo, ſo iſt klar, daß die Differenz verſchwinden und T auf den Werth von $T' - f$ zurückgehen muß, wenn man die von Faferſtoff eingefchloſſene Blutmenge zum defibrinirten Blute und den Rückſtand derſelben zum Rückſtand dieſes Blutes T' hinzurechnet und nun die prozentische Rückſtandsziffer berechnet. Im vorliegenden Falle hätten wir alſo $100 + 2,002$ grm. defibrinirtes Blut mit einem Rückſtand von $21,693 + 0,263$ d. h. der letztere beträgt 21,525 %. T wird alſo durch dieſe Correctur zwar von 21,693 % auf 21,525 % reducirt, bleibt dabei aber immer noch beträchtlich höher als der Werth von $T' - f$ (21,302); anders ausgedrückt die Differenz $T - (T' - f)$ die wir $= + 0,391 \%$ fanden, beträgt nach dieſer Correctur noch immer $+ 0,223$ grm.

Verfuch II. Pferdeblut (cf. Tab. III Nr. III).

Auf 100 grm. Blut bezogen erhielt ich:

Feuchten, bluthaltigen Faferstoff 2,872 grm., Trockengewicht deffelben 0,549 grm., reinen trocknen Faferstoff 0,297 grm. Die vom Faferstoff eingefchloffene Blutmenge betrug demnach 2,575 grm. und ihr Rückftand 0,352, macht 13,670 %. Der Rückftand des Gefammtblutes minus dem Faferstoff aber betrug 17,139 %. Der Rückftand von 100 grm. des defibrinirten Blutes betrug 17,412. Corrigirt man nun diefen Werth, fo findet man, dafs 100 + 2,575 grm. Blut einen Rückftand von 17,412 + 0,352 grm. geben, d. h. T ift jetzt 17,318 % gegen 17,412 % die wir durch Trocknen und Wägen des defibrinirten Blutes fanden. Die Differenz $T - (T' - f)$ verkleinert fich demnach von + 0,273 (cf. Tab. III Nr. II) auf + 0,179, aber fie ift bei weitem nicht beseitigt.

Verfuch III. Pferdeblut (cf. Tab. III Nr. IV).

Auf 100 grm. bezogen erhielt ich:

Feuchten, bluthaltigen Faferstoff 3,433 grm., Trockengewicht deffelben 0,801 grm., reinen trocknen Faferstoff 0,377 grm. Die vom Faferstoff eingefchloffene Blutmenge betrug demnach 3,056 grm. und ihr Rückftand 0,424 grm., macht 13,874 %, der Rückftand des Gefammtblutes minus dem Faferstoff aber war 17,376 %. T war = 17,640, nach Anbringung der entfprechenden Correctur finkt es auf 17,528 % und die Differenz $T - (T' - f)$ finkt von + 0,264 nur auf + 0,152.

Durch die Beobachtung, dafs der ausgefchlagene und darauf geprefte Faferstoff ein körperchenärmeres Blut einfchließt, ift nun zwar neben der Wafferverdunstung eine zweite Fehlerquelle aufgedeckt, welche den Rückftand des defibrinirten Blutes um ein Geringes zu hoch ausfallen

läßt, aber durch die Eliminirung dieses Fehlers wird die von uns beobachtete constante Differenz zwischen dem Rückstande des defibrinirten Blutes und dem Rückstande des Gesamtblutes minus dem Faserstoff nur zum kleineren Theil beseitigt. Es müssen also noch andere Ursachen diese Differenz mitbedingen.

Es fragt sich nun, inwieweit der durch die Einschließung unlöslicher Stromabestandtheile der rothen Blutkörperchen bedingte Fehler in der Faserstoffbestimmung an der Erzeugung jener Differenz schuld ist; diese Fehlerquelle wirkt offenbar nicht dadurch, daß sie sowie die früheren den Werth T zu hoch sondern dadurch, daß sie den Werth $T' - f$ zu niedrig ausfallen läßt. Es liegt in der Natur der Sache daß man über die Bedeutung dieses Fehlers nur dadurch ins Klare kommen kann, daß man seine maximalen Werthe bestimmt. Wir können uns zu dem Zwecke an die eben angeführten Versuche halten, in welchen uns die vom Faserstoff eingeschlossene Blutmenge bekannt ist. Es fragt sich nur, wie hoch wir das Gewicht der zu diesem Blute gehörigen, vom Faserstoff eingeschlossenen Stromabestandtheile zu schätzen haben. Ich will in dieser Hinsicht von der denkbar höchsten Annahme ausgehen.

Nehmen wir zuerst an, daß das Hunde- sowol als Pferdeblut 40 % rother Blutkörperchen enthalte und daß dies, entgegen unserer letzten Erfahrung, auch von demjenigen Blute gilt, welches im Faserstoff nach dem Pressen zurückbleibt; nehmen wir ferner an, daß die rothen Blutkörperchen 35 % festen Rückstand, und dieser 25 % Stroma enthalte, so ergibt sich durch eine einfache Rechnung, daß 100 grm. Blut 3,50 grm. Stromabestandtheile enthalten. Ein gegebenes Blutgewicht wäre also mit dem Faktor 0,035 zu multipliciren, um das Stromagewicht der in ihm enthaltenen

rothen Blutkörperchen zu erhalten. Nehmen wir endlich an, sämmtliche Stromabestandtheile blieben trotz des Auswaschens im Faserstoff zurück. Unter diesen Voraussetzungen läßt sich in den obigen drei Versuchen, in welchen die vom Faserstoff eingeschlossene Blutmenge bekannt ist, das dazu gehörige Stromagewicht berechnen; dieses vom Trockengewicht des Faserstoffes abgezogen, würde erst das wahre Gewicht des Faserstoffes geben und durch Abziehen dieses kleiner gewordenen Fibringewichtes vom Werthe T' würde man im einzelnen Falle erst den richtigen Ausdruck für diese Differenz erhalten.

Bevor ich diese Rechnung bei den drei letzten Versuchen zur Anwendung bringe, will ich noch bemerken, daß in denselben das Gewicht des vom Faserstoff eingeschlossenen Blutes etwas zu klein ausgefallen ist; denn dasselbe ist gefunden worden durch Abziehen des Gewichtes des ausgewaschenen und getrockneten, von dem des feuchten Faserstoffes, der erstere enthielt aber die festen Stromabestandtheile, welche also vom Blutgewicht mit abgezogen worden sind; dieselben sind also zum Blute hinzuzurechnen, das so erhaltene Blutgewicht ist mit 0,035 zu multipliciren und dann dieser Werth vom Trockengewicht des Faserstoffes abzuziehen. Nennen wir das durch Abziehen des trockenen vom feuchten Faserstoff erhaltene Gewicht x , so ist das wahre Blutgewicht $= x + 0,035$ (mit einem kleinen Fehler, weil x ja von vorne herein um etwas zu klein ausgefallen ist) und das Gewicht (st) der vom Faserstoff eingeschlossenen Stromabestandtheile $= (x + 0,035 \ x) \ 0,035$,

Führen wir diese Rechnung in Versuch I in welchem $x = 2,002$ war, aus, so erhalten wir $st = 0,071$.

Das Fibringewicht (0,223 grm.) reducirt sich hiernach auf 0,152 und die Differenz $T' - f$ wächst von 21,302

(Tab. II Nr. III) auf 21,373. Die Differenz $T - (T' - f)$ beträgt jetzt $+ 0,320$ gegen $+ 0,391$ in der Tabelle.

Führt man dieselbe Rechnung im zweiten Versuch aus, so findet man $st = 0,085$, das corrigirte

$$f = 0,297 - 0,085 = 0,212.$$

Die Differenz $T' - f$ wächst von 17,139 (Tab. III Nr. III) auf 17,224 und die Differenz $T - (T' - f)$ sinkt von

$$+ 0,273 \text{ auf } + 0,188.$$

Im dritten Versuch ist $st = 0,112$, das corrigirte

$$f = 0,377 - 0,112 = 0,265.$$

Die Differenz $T' - f$ wächst von 17,376 (Tab. III Nr. IV) auf 17,488 und die Differenz $T - (T' - f)$ sinkt von $+ 0,264$ auf $+ 0,152$.

Man sieht aus diesen Berechnungen, daß die Einschließung von Stromabestandtheilen durch den Faserstoff es zwar mit sich bringt, daß der Werth $T' - f$ zu klein ausfällt, aber dieser Fehler an sich ist so klein, daß er selbst unter den denkbar höchsten Annahmen bei weitem nicht hinreicht, um die von uns beobachtete constante Differenz zwischen den Werthen $T' - f$ u. T zu erklären.

Nun ist aber klar, daß in unseren Versuchen die drei eben besprochenen Fehlerquellen, 1) die Wasserverdunstung beim Defibriniren; 2) die Körperchenarmuth des vom Faserstoff eingeschlossenen Blutes, und 3) der Gehalt des Faserstoffes an unlöslichen Stromabestandtheilen, stets zusammengewirkt haben; es fragt sich deshalb, ob daraus nicht eine Gesamtfehlerquelle resultirt, die groß genug wäre die constanten Differenzen zwischen T u. $T' - f$ zu erklären. Wir wollen versuchen auch diese Rechnung in unsern drei Beispielen auszuführen.

Hierbei ist nun aber zu berücksichtigen, daß wir zwar für die in Betreff des Körperchengehaltes veränderte Beschaffen-

heit des vom Faferstoff eingeschlossenen Blutes, in unsern Versuchen selbst, die nöthigen Rechnungsdaten finden; ebenso können wir den Verdunstungsfehler, da das Defibriniren auch in diesen Versuchen 10 Minuten dauerte mit einiger Wahrscheinlichkeit zu 0,35 % des Blutgewichtes annehmen. Für die Berechnung des vom Faferstoff eingeschlossenen Gewichts von Stromabestandtheilen fehlen uns aber alle Anhaltspunkte, da wir hierbei unmöglich von der übermaximalen Annahme, welche uns zur Durchführung der eben ausgeführten Rechnungen gedient haben, ausgehen können. Es ist hierbei noch besonders zu berücksichtigen, daß wir durchaus nicht angeben können, wie groß der Blutkörperchendeffect in dem vom Faferstoff eingeschlossenen Blute ist. Deshalb werde ich in meinen drei obigen Versuchen zuerst den Verdunstungsfehler eliminiren, dann den durch die veränderte Zusammensetzung des im Faferstoff eingeschlossenen Blutes bedingten. Durch beides wird offenbar der Werth von T und ebenso auch die Differenz von $T - (T' - t)$ verkleinert werden; vom Rest derselben läßt sich dann leicht schätzen, ob er einzig nur von den im Faferstoff eingeschlossenen Stromabestandtheilen abgeleitet werden kann, oder ob noch eine vierte Fehlerquelle existiren muß.

Nehmen wir im ersten Versuch an, es habe überhaupt keine Verdunstung beim Defibriniren stattgefunden d. h. beziehen wir die betreffenden Wägungsergebnisse nicht auf 100, sondern auf 100,35 grm. Blut und berechnen hiernach die procentischen Werthe, so erhalten wir

$$T = 21,617 \text{ (statt } 21,693) \text{ grm.}$$

$$f = 0,222 \text{ (statt } 0,223) \text{ grm.}$$

Der feuchte bluthaltige Faferstoff beträgt dann 2,217 (statt 2,225) grm. Das eingeschlossene Blut $2,217 - 0,222 = 1,995$ (statt 2,002) grm. Der Trockenrückstand des er-

fteren 0,484 (statt 0,486) und derjenige des eingeschlossenen Blutes $0,484 - 0,222 = 0,262$ (statt 0,263) was 13,233 % ausmacht.

Bei der zweiten Correctur können wir, da alle obigen Zahlen Prozente ausdrücken wieder von 100 grm. Blut ausgehen. Es geben nämlich $100 + 1,995$ grm. defibrinirtes Blut einen Rückstand von $21,617 + 0,264$ grm., was 21,453 % ausmacht. Der Rückstand des Gesamtblutes minus dem Faferstoff war aber in diesem Versuch 21,302, also bleibt zu Gunsten des defibrinirten Blutes immer noch eine Differenz von 0,151 grm. übrig. Soll diese Differenz von den im Faferstoff zurückgebliebenen unlöslichen Stromabestandtheilen abgeleitet werden, so müßten 0,222 grm. Faferstoff 0,151 grm. der letzteren enthalten und da der feuchte Faferstoff 1,995 grm. Blut enthält, so müßte dieses Blut seinerseits 0,151 grm. d. h. 7,569 % an Stromabestandtheilen und zwar allein an unlöslichen enthalten haben. Nun haben wir aber gesehen, daß selbst unter den höchsten Annahmen die Summe der löslichen und unlöslichen Stromabestandtheile zusammen nur 3,55 % des Blutes ausmachen können; dazu kommt, daß das vom Faferstoff eingeschlossene Blut ein jedenfalls sehr körperchenarmes ist; es ist also ganz unmöglich die, nach Berücksichtigung der Wasserverdunstung und der veränderten Zusammensetzung des vom Faferstoff eingeschlossenen Blutes, übrig bleibende Differenz allein von den im Faferstoff enthaltenen unlöslichen Stromabestandtheilen abzuleiten; es muß noch eine vierte, bei der Erzeugung dieser Differenz, mitwirkende Ursache geben.

Im zweiten Versuch erhalten wir nach Eliminirung des Verdunstungsfehlers (0,35 %) zunächst folgende Werthe:

$$T = 17,351 \%,$$

$$f = 0,296 \%,$$

Für die übrigen Werthe haben wir dann:

Der feuchte Faferstoff = 2,862%, das Trockengewicht desselben 0,647%, demnach das vom ersteren eingeschlossene Blut = $2,862 - 0,296 = 2,566\%$ und das Trockengewicht desselben = $0,647 - 0,296 = 0,350\%$. Der Rückstand dieses Blutes beläuft sich also auf 13,679%. Demnach geben 102,566 grm. defibrinirten Blutes einen Rückstand von 17,351 + 0,351 = 17,702, was 17,259% ausmacht.

$T' - f$ war in diesem Versuche aber = 17,139, also beträgt die Differenz immer noch + 0,120. Es müßten also 0,296 grm. Faferstoff 0,120 grm., beziehungsweise müßten 2,566 grm. vom Faferstoff eingeschlossenen Blutes 0,120 grm., das sind 4,676%, unlöslicher Stromabestandtheile enthalten, was gleichfalls unmöglich erscheint.

Im dritten Versuch erhalten wir, nach Correctur, zunächst des Verdunstungsfehlers folgende Werthe:

$$T = 17,578\%,$$

$$f = 0,376\%,$$

feuchter Faferstoff 3,421%, das Trockengewicht desselben 0,798%, also das vom ersteren eingeschlossene Blut = 3,045% und das Trockengewicht desselben = 0,422%. (Der Rückstand dieses Blutes beläuft sich also auf 13,859%.)

103,045 grm. defibrinirten Blutes geben also einen Rückstand von $17,578 + 0,422$ grm., was 17,468% ausmacht. $T' - f$ war aber in diesem Versuche = 17,376, also ist $T - (T' - f)$ immer noch = + 0,092. In 0,376 grm. trockenem Faferstoff, beziehungsweise in 3,045 grm. eingeschlossenem Blut, müßten also 0,092 grm. unlöslicher Stromabestandtheile enthalten sein, was mit Bezug auf das Blut 3,021% ausmacht; unter Berücksichtigung der erwähnten Umstände erscheint auch dies nicht möglich.

Wir kommen also zu dem Resultate, daß es außer den drei genannten Urfachen, noch eine vierte geben muß, welche die constante Gewichts-differenz zwischen T und T' — f verschuldet. Stellen wir nun diese Differenzen, wie sie von vornherein und wie sie nach Anbringung der beiden so eben ausgeführten Correcturen (betreffend den durch die Verdunstung und den durch die veränderte Zusammensetzung des vom Faferstoff eingeschlossenen Blutes, bedingten Fehler) sich darstellen, unter der Bezeichnung a und b einander gegenüber, so finden wir in

	a	b	$\frac{b}{a}$
Verf. I	+ 0,391	+ 0,151	+ 0,39
Verf. II	+ 0,273	+ 0,120	+ 0,44
Verf. III	+ 0,264	+ 0,092	+ 0,35

Es ergibt sich also, daß die nach diesen Correcturen übrigbleibenden Differenzen noch immer mehr als ein Drittheil von dem ursprünglichen betragen; der Fehler, welcher durch die im Faferstoff zurückbleibenden unlöslichen Stromabestandtheile dargestellt wird, ist gewiß ein sehr kleiner, aber soviel wird er immerhin bewirken, daß wir annehmen dürfen, daß nach Beseitigung desselben die übrigbleibende Differenz etwa auf $\frac{1}{3}$ des ursprünglichen Gewichts reducirt wird. Für diesen Rest hätte man sich also nach einer vierten Fehlerquelle umzusehen.

Worin soll nun diese Fehlerquelle bestehen? Ich sehe nur folgende Möglichkeiten:

entweder 1) das defibrirte Blut hält die letzten Spuren von Wasser energischer zurück beim Trocknen, als das nicht defibrirte, oder 2) das defibrirte Blut nimmt beim Trocknen irgend etwas aus der Atmosphäre auf (Sauerstoff?) beziehungsweise das ungeronnene Blut verliert dabei irgend etwas an die Atmosphäre.

Beide Möglichkeiten setzen voraus, daß durch das Defibriniren eine Veränderung in irgend welchen Bestandtheilen der Blutkörperchen oder des Blutplasma herbeigeführt wird.

Durch das Defibriniren wurde aber in v. Göttschel's und meinen Versuchen zweierlei bewirkt und zwar 1) die Fibrinausscheidung und 2) die Umwandlung von venösem in arterielles Blut.

Daß in der Fibrinausscheidung eine doppelte Fehlerquelle gegeben ist, insofern der feuchte Faserstoff Blut von veränderter Zusammensetzung und der ausgewaschene trockene Faserstoff die unlöslichen Stromabestandtheile der rothen Blutkörperchen einschließt, haben wir bereits gesehen. Wie der Vorgang der Faserstoffausscheidung noch in einer dritten Weise eine absolute oder relative Erhöhung der Rückstandsziffer des defibrinirten Blutes herbeiführen kann, vermag ich mir nicht abzuleiten. Eine Beobachtung v. Göttschel's spricht aber dafür, daß beim Defibriniren des Blutes eine Fehlerquelle zur Wirkung kommt, welche mit dem Proceß der Faserstoffgerinnung selbst nichts zu thun hat. Ich weise in dieser Beziehung auf v. Göttschel's Versuch V hin.¹⁾

Die letzte in diesem Versuch nach der Jaucheinjection der ven. jug. ext. entnommene Blutprobe gerann nämlich trotz 10 minutenlangen Umrührens überhaupt gar nicht und blieb auch bei weiter fortgesetzter Beobachtung dauernd flüssig; dennoch ist der Rückstand des Gesamtblutes kleiner als derjenige des defibrinirten. Ersterer betrug 20,207 % letzterer 20,475 %. Die Differenz ist + 0,268. v. Göttschel bezieht auch diese Differenz einzig auf den Wasserverlust beim Umrühren des Blutes; derselbe aber hätte alsdann

1) v. Göttschel. Inaug. Diss. 1883 Dorpat, pag. 57.

1,31 % des Blutgewichtes betragen müssen, was umsomehr unmöglich erscheint, als der Defibrinirungsversuch auch dieses Mal nur 10 Minuten gedauert hatte. Nehmen wir statt dessen an, der factische Wasserverlust habe auch in diesem Versuch 0,35 % betragen, so sinkt die hiernach corrigirte Rückstandsziffer des defibrinirten Blutes von 20,475 auf 20,404, also um 0,71; sie bleibt aber immer noch um 0,197 höher als die Rückstandsziffer des Gesamtblutes. Und doch konnte hier, abgesehen von der Wasserverdunstung, keine der beiden anderen bisher betrachteten Fehlerquellen zur Geltung gekommen sein, da eine Faserstoffausscheidung ja überhaupt gar nicht stattgefunden hatte. Es muß also die Manipulation des Defibrinirens in irgend einer anderen Weise, und zwar unabhängig von der dabei stattfindenden Faserstoffausscheidung, das Rückstandsgewicht des Blutes beeinflussen haben.

Beim Defibriniren wurde nun aber in unseren Versuchen das ursprünglich venöse Blut arteriell, es wurde sauerstoffreicher und kohlenensäureärmer als es war. Es erscheint nun möglich, daß der Sauerstoff resp. ein Theil desselben im Dampf- oder Luftbade festere Verbindungen im Blute eingeht und dabei Substanzen erzeugt oder freimacht, welche entweder Wasser energisch zurückhalten, oder welche weiteren Sauerstoff aus der Luft aborbiren, oder welche endlich gewisse im Gesamtblute beim Abdunstungs- und Trocknungsproceß eintretende gasförmige Zersetzungsvorgänge im defibrinirten Blute hemmen. Dadurch würde ein Gewichtsunterschied in den betreffenden Rückständen erzeugt werden, der um so größer ausfallen müßte, je größer der Unterschied im Sauerstoffgehalt war. In den beiden ersten der drei obigen Fälle wäre die Rückstandsziffer des defibrinirten,

im dritten diejenige des Gesamtblutes fehlerhaft und zwar würde sie dort zu hoch und hier zu niedrig ausfallen.

Es erhebt sich nun die Frage, welche von den beiden Werthen $T' - f$ u. T als der richtigere in die Rechnung einzuführen ist. v. Goetschel hat sich des ersteren bedient, und wenn er auch in Betreff der, die Differenz zwischen beiden Werthen bewirkenden Fehlerquelle von einer falschen Voraussetzung ausging, so ergeben die vorstehenden Untersuchungen, daß er mit seinem Verfahren der Wahrheit näher gekommen ist, als wenn er den Werth T benutzt hätte. Die Differenz $T' - f$ ist zwar auch fehlerhaft und zwar ist sie schon wegen der unlöslichen vom getrockneten Faferstoff eingeschlossenen Stromabestandtheilen zu klein, aber dieser Fehler ist sicherlich sehr unbedeutend, während, wie wir gesehen haben, etwa $\frac{2}{3}$ der ganzen zwischen T u. $T' - f$ bestehenden Differenz, vielleicht aber sogar die ganze, dem ersteren nämlich T als Fehler zur Last fällt.

Ich werde mich demnach gleichfalls nicht der Rückstandsziffer des defibrinirten Blutes bei meinen Rechnungen bedienen, ebensowenig aber auch der um das Fibringewicht verminderten Rückstandsziffer des Gesamtblutes; denn letztere Differenz ist jedenfalls an sich schon, wenn auch nur um ein geringes, zu klein; falls aber das dritte, nach seiner Ursache noch nicht erklärte Drittel der Differenz $T - (T' - f)$, dem Trockenrückstand des Gesamtblutes, also dem Werthe T' zur Last fällt, so würde der Fehler schon beträchtlich werden. Ich halte es für das sicherste eine Gröfse zu wählen, welche zwischen den beiden Extremen, zwischen zu klein und zu groß, liegt und werde deshalb an der Hand meiner bisherigen Erfahrungen so verfahren, daß ich $\frac{2}{3}$ von der zwischen T u. $T' - f$ bestehenden Differenz von T abziehen resp. $\frac{1}{3}$ derselben zu $T' - f$ hinzu addire. Die Ziffer für

den, aus dem defibrinirten Blute gewonnene Rückstand der rothen Blutkörperchen in 100 grm. Blut werde ich alsdann natürlich proportional T verkleinern.

Ich habe mich mit diesem Gegenstand so ausführlich befaßt, weil ein Fehler von der Gröfse der constanten vorkommenden Differenzen zwischen den Werthen T u. $T' - f$, so klein er erscheint, wenn man ihn nur mit Rücksicht auf diese Werthe selbst betrachtet, doch in der Rechnung beträchtliche Ungenauigkeiten in der Feststellung des Gewichtes der Blutkörperchen und ihres Rückstandes bewirkt; er macht sich aber nur fühlbar, wo es sich um die Ermittlung absoluter Gröfsen handelt. Wo dagegen, wie in der Arbeit von v. Götschel, die Untersuchung nur bezweckt die Veränderungen zu ermitteln, welche diese Gröfse durch irgendwelche äufsere Eingriffe, wie z. B. durch Injection jauchiger Flüssigkeiten, erleiden, da erscheint es ziemlich gleichgültig, ob man T oder $T' - f$ oder einen zwischenliegenden Werth in Rechnung bringt, die eingetretenen Veränderungen zeigen sich in jedem Falle. Um diese Behauptung zu beweisen, entnehme ich der v. Götschel'schen Arbeit die Tabelle C zum Versuch V (l. c. pag. 60), welche die auf Grundlage des Werthes $T' - f$ berechneten Resultate enthält. Auf diese lasse ich eine zweite folgen, in welche ich die auf Grundlage von T berechneten Resultate desselben Versuches aufnehmen werde. An diese letztere schliesse ich die Betrachtungen an, welche v. Götschel über diesen Versuch anstellt und zwar wörtlich, mit Ausnahme natürlich der im Text vorkommenden, aus der Tabelle entnommenen Zahlen, welche ich durch die meinigen ersetzen werde. Man wird finden, dafs jedes Wort des Textes auch auf meine Tabelle paßt, trotz der nicht unbedeutlichen absoluten Unterschiede unserer Zahlen. Dies

gilt, wie ich beiläufig bemerken will, von sämtlichen Versuchen v. Göttschel's, welche ich alle von diesem Gesichtspunkte aus umgerechnet habe. Nur die Angabe über die Körpertemperatur lasse ich aus.

Grundlage T' — f (v. Goettschel.)

Nummer der Blut- abnahme.	b.	R.	Spec. Gew.	Rel. Hämoglobin- gehalt.	Relatives r.
I.	31,561	34,798	1049,3	100,00	100,00
II.	36,090	36,435	1052,7	122,48	119,73
III.	42,994	34,732	1057,2	163,93	135,97

Grundlage T (Kupffer).

Nummer der Blut- abnahme.	b	R.	Spec. Gew.	Rel. Hämoglobin- gehalt.	Relatives r.
I.	30,695	36,237	1049,3	100,00	100,00
II.	35,214	37,851	1052,7	122,48	119,83
III.	42,240	35,821	1057,2	163,93	136,03

Die unmittelbar an diese Tabelle sich anschließenden Bemerkungen von v. Goettschel lauten:

„Zunächst sehen wir, daß sämtliche Werthe im Blute im Laufe der wenigen Stunden, um welche das Thier die Injection überlebte¹⁾ zu einer außerordentlichen Höhe anwachsen, und zwar das Hämoglobin allen voran. Die einzige Ausnahme bildet der procentische Rückstand der rothen Blutkörperchen (R), welcher, nachdem auch er von der Blutprobe I zur Blutprobe II gestiegen, von dieser zur Blutprobe III wieder sinkt.“

„Das Gesamtgewicht der Blutkörperchen (b)²⁾ wächst bis zur Blutprobe II, von 30,695 bis 35,214, also um 14,72 % (14,35 bei v. G.) Das Gesamtgewicht des

1) Die Injection von Janche fand zwischen dem ersten und zweiten Versuch statt.

2) b in Blutprobe I (30,695) ist hierbei gleich 100 gesetzt worden.

Blutes an fester Blutkörperchen-Substanz (relat. r) aber wächst viel rascher, nämlich um 19,83 % (19,73 bei v. G.). Das erklärt sich aus dem Umstande, daß, während die Menge der rothen Blutkörperchen zunimmt, ihre Concentration (R) sich nicht gleich bleibt, sondern gleichfalls wächst.“

„Das Gesamtgewicht der Blutkörperchen (b) in der Blutprobe III zeigt eine weitere Erhöhung um 22,89 % (21,88 bei v. G.), also verglichen mit der Blutprobe I im Ganzen um 37,61 % (36,23 bei v. G.); der Gehalt des Blutes an fester Blutkörperchen-Substanz hat um 36,03 % (35,97 bei v. G.) zugenommen. Diese annähernde Uebereinstimmung (zwischen b und r) entspricht dem Umstande, daß die Concentration der Blutkörperchen (R) in der Blutprobe III der in der ersten fast genau gleich ist.“

„Aber nicht bloß, daß die Gesamtmenge der Blutkörperchen und damit der Gehalt des Blutes an fester Blutkörperchen-Substanz so außerordentlich in Folge der Injection gewachsen ist, sondern diese Substanz hat zugleich auch ihre Zusammensetzung wesentlich geändert und zwar gerade im umgekehrten Sinne, als wir es in den vorhergehenden beiden Versuchen beobachtet haben.

Während der auf das Blut bezogene prozentische Gesamttrückstand der Blutkörperchen in der Blutprobe II eine Erhöhung um 19,83 % (19,73 bei v. G.) erfahren hat, beträgt die Zunahme des Oxyhämoglobingehalts des Blutes 22,48 % und während ersterer endlich in Blutprobe III 36,03 % (35,97 bei v. G.) gewachsen ist, zeigt der Oxyhämoglobingehalt gar eine Zunahme um 63,93 %. In Folge der Jaucheinjection wurden also die Blutkörperchen in diesem Versuche hämoglobinreicher und stromaärmer.“

„Die Aenderungen des spec. Gewichts entsprechen wiederum dem Wachsthum des Hämoglobins, nächst dem

demjenigen des Gefammtrückftandes der Blutkörperchen (r). Der letztere zeigt von der Blutprobe I zur Blutprobe II eine ftärkere Zunahme, als von der Blutprobe II zur Blutprobe III; umgekehrt verhält es fich mit dem Hämoglobin, und gerade wie das Hämoglobin, wächst auch das specifische Gewicht.“

Man fieht die durch die Jaucheinjection bewirkte Blutveränderung tritt gleichmäfsig hervor, ob man den zu grofsen Werth T oder den zu kleinen Werth T' — f der Rechnung zu Grunde legt. Näher als diefe beiden Werthe wird aber jedenfalls ein zwifchen ihnen liegender der Wahrheit kommen.

II. Bestimmung des Abforptionsverhältniffes beim Hundehämoglobin.

Die zu diefen Bestimmungen erforderlichen Blutkryftalle gewann ich aus dem Hundeblood durch Auflöfen des aus der placenta fanguinis erhaltenen, möglichft ferumarmen Blutes in 4—5 Theilen Waffer und Zufatz von $\frac{1}{5}$ — $\frac{1}{4}$ vol. Alkohol. In der Kälte erftarrte die ganze Maffe nach ein paar Tagen zu einem feifen Kryftallbrei. Derselbe wurde durch Leinwand filtrirt, der Rückftand mehrfach mit eiskaltem, ftark verdünntem Alkohol ausgewafchen, dann in eine Schale gebracht, in Waffer unter Zufatz fehr geringer Mengen einer titrirten NH_3 -Lösung aufgelöst, darauf mit einer titrirten, entfprechend verdünnten Salzfäurelösung neutralifirt, etwa $\frac{1}{5}$ vol. ftarken Alkohols zugefetzt und die Lösung wiederum der Kälte ausgesetzt. In derfelben Weife verfuhr ich das dritte Mal.

Die auf diefe Weife gereinigten Kryftalle wurden dar-
auf im Laufe von 1—2 Stunden mehrfach mit eiskaltem

etwas Alkohol enthaltendem Wasser dekantirt, dann auf ein Filtrum gebracht, hier, ohne Rücksicht auf die eintretenden Verluste, noch mehrfach mit kaltem Wasser gewaschen, dann der Rückstand im Ueberschuß in Wasser, das Zimmertemperatur hatte, gebracht, hierin unter wiederholtem Aufrühren der Krysfalle ein paar Stunden stehen gelassen und schließlich filtrirt.

Das Filtrat erwies sich aber stets als zu concentrirt zu den spectrophotometrischen Bestimmungen, es mußte deswegen noch weiter verdünnt werden. Ich bestimmte nun an einigen Proben in welchem Verhältniß die Verdünnung stattfinden mußte, damit diejenige Concentration erreicht werde, von welcher an ich in absteigender Linie meine photometrischen Bestimmungen beginnen wollte. Diese obere Concentrationsgrenze der zur Ermittlung der Exstinctionscoefficienten benutzten Krysfalllösung wurde natürlich mittelst des von mir benutzten Spectrophotometers bestimmt; ich verdünnte meine Krysfalllösung soweit mit Wasser, bis der Winkel des Theilkreises bei Anwendung des von mir ein für alle Mal festgestellten Spektralbezirkes ca. 70° betrug.

In einem kleinen gewogenen Ballon mit Glasverschluß wurden nun 40 Ccm. Wasser, welches 0,023 % kohlenfaures Natron enthält, gebracht und gewogen, darauf die durch die eben erwähnten Versuche ermittelte, erforderliche Quantität der Blutkrysfalllösung mittelst einer Pipette hinzugefügt und wieder gewogen. Ich kannte also jetzt das Gesamtgewicht der Lösung im Ballon sowie dasjenige ihrer beiden Bestandtheile, der verdünnten kohlenfauren Natronlösung und der zugesetzten Blutkrysfalllösung. Jetzt wurde eine gewisse Quantität (ca. 10 % der ganzen Lösung) mittelst einer Pipette zur Bestimmung des Exstinctionscoefficienten herausgenommen, der Verlust durch Wägung bestimmt, sogleich

mit der, mittlerweile ausgewaschenen Pipette durch die entsprechende Quantität der kohlenfauren Natronlösung ersetzt, vorsichtig geschwenkt und wieder gewogen. Zum zweiten Mal wurde dieselbe Menge der Blutfarbstofflösung, wie das erste Mal zur spectrophotometrischen Bestimmung mittelst einer Pipette herausgehoben, der Rest gewogen, der Verlust ersetzt, gewogen etc. bis ich eine Reihe von 5 Präparaten in regelmässig steigender Verdünnung behufs Ermittlung des Extinctionscoefficienten gewonnen hatte. Durch eine einfache Rechnung ergab sich nun der Gehalt dieser Präparate an Blutkrystalllösung, aber die Rechnung basirte nicht auf volumetrische Bestimmungen, sondern auf Wägungen. Die Pipette diente mir nur zur Erleichterung meines Verfahrens. Der Hals des Kölbchens darf nicht zu eng sein, damit die Pipette seine Innenwand beim Hinein- und Herausführen nicht berührt, wobei leicht ein Tropfen der Blutfarbstofflösung oder der kohlenfauren Natronlösung am Halse hängen bleibt und die Wägung beeinträchtigt wird. Ich bemerke, dass ich den Extinctionscoefficienten meiner Präparate, sofort nach dem Herausheben derselben aus dem Kölbchen bestimmte, weshalb die Arbeit an der Wage von einem zuverlässigen Gehilfen ausgeführt wurde; ferner, dass sie vor dieser Bestimmung mit Luft geschüttelt wurden, was übrigens mehrfach auch schon mit der concentrirten Krystalllösung selbst vor der Wägung geschehen war. Als richtigen Extinctionscoefficienten benutzte ich in diesen so wie in allen späteren Versuchen das Mittel von zehn Bestimmungen. Es bedürfte jetzt nur noch der Bestimmung des Rückstandes in der zur Herstellung dieser Präparate benutzten concentrirten Krystalllösung, um zu ermitteln, wieviel jedes derselben an fester Krystallsubstanz enthielt. Der Rest der ursprünglichen Krystalllösung wurde deshalb in einer Platinschale gewogen, im Vacuum über Schwefel-

felsäure getrocknet, wobei der scheinbar schon trockene Rückstand noch einige Tage im Vacuum verblieb und schliesslich das Trocknen anfangs bei nahezu 100°, dann bei 115—120° fortgesetzt. Das Trocknen in der Wärme dauerte 24 Stunden. Hieran schloss sich die Wägung des Rückstandes. Ein Apparat zum Trocknen im Wasserstoffstrom stand mir leider nicht zu Gebote.

Der Gehalt meiner Präparate an Oxyhämoglobin, d. h. ihre Concentration (c) war nun leicht ermittelt und konnte zusammen mit dem entsprechenden Extinctionscoefficienten zur Bestimmung des Absorptionsverhältnisses dienen.

Der von mir benutzte Apparat war der neue Hüfnersche, derselbe mit welchem auch v. Göttschel gearbeitet hatte. Nachdem ich mich etwa 5 Wochen lang im Gebrauch desselben geübt hatte, stellte ich ihn mir ein für alle Mal für meine ganze Versuchsreihe so ein, dass der Schieber der linken Seite in Normalstellung blieb, während der der rechten Seite um einen Theilstrich der Führungstheilung nach rechts verrückt wurde, der Zeiger der horizontalen Skala auf 69,9 zeigte und der Compensationskeil von Rauchglas den Unterschied der Lichtintensität in den beiden übereinanderliegenden Spectralfeldern fast ausglich.

Vorher hatte ich mittelst der Fraunhofer'schen Linie E festgestellt, dass ein Theilstrich der Führungstheilung äquivalent ist 8,73 Graden der horizontalen Skala. Ferner fand ich, dass bei Einstellung genau auf die Mitte des Gesichtsfeldes, die Mitte des Fraunhofer'schen Linienpaares D bei 54 und die Linie E bei 82,28 auf der horizontalen Skala lag, so dass die Differenz zwischen D und E 28,28 Graden dieser Skala und demnach die Breite des Ausschnittes 30,87 Fraunhofer entsprach. Bei der von mir ein für alle Mal gewählten Einstellung, bei welcher der horizontale Zeiger auf 69,9

zeigte und der rechte Schieber um einen Theilstrich der Führungslinie nach rechts verrückt, der linke aber in Normalstellung geblieben war, überfah ich also den Spektralbezirk D 56 E - D 87 E, welcher in der Region des zweiten Blutbandes liegt¹⁾.

Wenn ich 0,30 — 0,35 Ccm. Hundeblut (von verschiedenen Thieren) mit 40 Ccm. Wasser verdünnte und dann die Exstinctionscoefficienten bei der von mir gewählten Einstellung des Apparates bestimmte, so fand ich in einigen Vorversuchen, daß dieselben einem Winkel entsprachen, welcher zwischen 60 und 70° lag. Deshalb wollte ich auch das Absorptionsverhältniß immer innerhalb dieser Grenzen bestimmen.

In der folgenden Tabelle stelle ich die Ergebnisse einer solchen Bestimmung zusammen. Das Blut war dreimal krytallisirt worden und die Concentration nimmt von Mal zu Mal um ca. 10% ab. Das Absorptionsverhältniß A ist bekanntlich $= \frac{c}{\epsilon}$. Ich füge auch die Winkel (φ) hinzu.

φ	c	ϵ	A
69°26'	0,1329	0,90866	0,1463
67°21'	0,1208	0,82886	0,1457
64°13'	0,1097	0,72308	0,1517
61°41'	0,0997	0,64782	0,1535
58°43'	0,0855	0,57338	0,1491
Mittel 0,1493			

1) v. Goetschel gibt an, dass die Differenz zwischen D. u. E an unserem Apparat 34,5° der horizontalen Skala entsprochen habe; ich vermuthe jedoch, dass er die Linie E mit der Linie b verwechselt hat. In diesem Falle ist seine Angabe über die von ihm benutzte Spektralregion unrichtig, was aber deshalb für seine Versuche nicht von Bedeutung ist, als er thatsächlich stets in derselben Region seine Blutlösung untersucht hat und durch seine Exstinctionscoefficienten nur die relativen Aenderungen des Hämoglobingehaltes im Blute bestimmte.

Hieran schliesse ich eine zweite Tabelle an, welche sich auf dasselbe, aber nur zweimal krySTALLisirte Hundeblut bezieht, sodafs die betreffenden Bestimmungen einige Tage vor dem vorigen stattfanden, deren Resultate die eben angeführte Tabelle enthält. Veranlafst wurde ich dazu durch die Reinheit und vortreffliche Ausbildung der KryStalle zweiter Auscheidung. Auch hier nimmt die Concentration von oben nach unten stetig um ca. 10% ab.

η	c	ϵ	A
69°50'	0,1277	0,92498	0,1381
67°16'	0,1160	0,82582	0,1405
65°15'	0,1052	0,75628	0,1391
62°41'	0,0955	0,67654	0,1412
59°43'	0,0859	0,59466	0,1445
Mittel 0,1407.			

Nach diesen Bestimmungen fällt das Absorptionsverhältnifs, d. h. der Quotient $\frac{\eta}{\epsilon}$ nach dreimaligem KrySTALLifiren höher aus, als nach zweimaligem, während doch das Gegentheil zu erwarten war, da der Zähler der Basis $\frac{\eta}{\epsilon}$ ja um so kleiner ausfallen mufs, je besser das Hämoglobin von Beimengungen befreit worden ist.

Ich hatte anfangs die Absicht auch das Pferdeblut zu analysiren und bestimmte deshalb auch in diesem das Absorptionsverhältnifs des Oxyhämoglobins und zwar gleichfalls nach 2 und 3-maligem KrySTALLifiren. Ich habe diese Absicht aus Mangel an Zeit aufgegeben, führe aber die gefundenen Absorptionsverhältnisse hier an. Der Zeiger der horizontalen Skala stand bei diesen Bestimmungen (welche denjenigen an Hundehämoglobin zeitlich vorausgingen), nicht auf 69,9, sondern auf 69,6. Deshalb sind die Werthe von A wol alle etwas anders ausgefallen, als es der Fall gewesen wäre, wenn der Zeiger hier gleichfalls auf 69,9 ge-

standen hätte. Aber da dies für beide am Pferdeblut angestellten Bestimmungen gilt, so sind die Resultate durchaus unter einander vergleichbar. Ferner betragen die Konzentrationsunterschiede hier nicht 10 sondern 5 ‰.

Aus der folgenden Tabelle erficht man die Resultate:

Nach 3-maliger KrySTALLISATION.

φ	c	ε	A
71°26'	0,1603	0,99404	0,1613
70°7'	0,1527	0,93678	0,1630
68°30'	0,1451	0,87184	0,1664
66°58'	0,1385	0,81506	0,1699
65°29'	0,1318	0,76400	0,1725
			Mittel 0,1666

Nach 2-maliger KrySTALLISATION desselben Blutes

φ	c	ε	A
70°16'	0,1454	0,94318	0,1542
69°5'	0,1384	0,89464	0,1547
67°44'	0,1318	0,84290	0,1564
66°23'	0,1254	0,79454	0,1578
64°59'	0,1193	1,74756	0,1596
			Mittel 0,1565

Wiederum zeigt sich, daß das Abforptionsverhältniß nach 3 maligem KrySTALLISIREN des Hämoglobins höher ausfällt, als nach 2 maligem; der Unterschied beträgt $\pm 6,5$ ‰ beim Hundehämoglobin betrug er $\pm 6,1$ ‰. Da die Berechnung der absoluten Oxyhämoglobin-Menge darauf beruht, daß die im betreffenden Blute gefundenen Exstinctions-coefficienten mit dem Abforptionsverhältnisse als constantem Faktor multiplicirt werden, so würde ein Fehler von über 6 ‰ in diesem Faktor eben auch den gleichen Fehler in der Hämoglobinbestimmung herbeiführen. Es erhebt sich

also die Frage, welcher von den beiden, beim Hunde- sowohl als dem Pferdeblute gefundenen Werthen des Absorptionsverhältnisses das Richtigere ist, oder doch der Wahrheit am nächsten kommt. Gehen wir davon aus, daß das Hämoglobin nach 2 maliger KrySTALLISATION noch nicht so vollkommen von verunreinigenden Beimengungen befreit gewesen, wie nach 3 maliger, so müßte schon dort das Absorptionsverhältniß zu hoch ausfallen; finden wir nun trotzdem nach dreimaligem KrySTALLISIREN ein noch höheres Absorptionsverhältniß, als nach zweimaligem, so muß die Lichtabsorption durch das Oxyhämoglobin während oder durch das KrySTALLISIREN eine Veränderung erleiden, durch welche die durch die fortgesetzte Reinigung des Oxyhämoglobins bewirkte Verkleinerung des Zählers im Bruche $\frac{c}{\epsilon}$ übercompensirt wird. Damit haben wir aber einen zweiten Grund zu der Annahme, daß schon nach 2 maligem KrySTALLISIREN, eben durch diesen Vorgang selbst, das Absorptionsverhältniß zu hoch ausgefallen ist, aber es würde dem des nicht krySTALLISIRTEH Hämoglobins doch immer noch näher kommen, als das im dreimal krySTALLISIRTEH Blute gefundene.

Ein weiterer Grund für die Annahme, daß alle meine für das Absorptionsverhältniß gefundenen Werthe zu hoch sind, kann in dem Umstande liegen, daß ich die Rückstände meiner KrySTALLLÖSUNGEN nicht im Wasserstoffstrom getrocknet habe. Aber dies gilt eben von allen meinen Bestimmungen und erklärt nicht die zwischen zwei- und dreimal krySTALLISIRTEH Hämoglobin gefundenen Differenzen.

Von dieser Ueberlegung ausgehend, habe ich in meinen weiteren, nur das Hundeblut betreffenden Versuchen, den dem zweimal krySTALLISIRTEH Hämoglobin entsprechenden Werth des Absorptionsverhältnisses, als den kleinern, meinen Berechnungen der absoluten Oxyhämoglobinmenge zu Grunde

gelegt, d. h. die Zahl 0,1407. Wir werden sehen, daß die Ergebnisse dieser Berechnungen zusammengehalten mit den übrigen Resultaten der Analyse, es sehr wahrscheinlich machen, daß auch diese Zahl noch zu groß ist, wenn auch nur vielleicht um ein Geringes.

Ich fühle selbst, daß die eben erwähnten Versuche, welchen zufolge das krySTALLisirte Oxyhämoglobin ein anderes Absorptionsverhältniß besitzt, als das nicht krySTALLisirte, einer Wiederholung resp. einer Variirung und Prüfung bedürfen, bin aber dies zu thun nicht im Stande. Meine Blutanalysen glaube ich aber doch mittheilen zu müssen, da sie, auch abgesehen von den Hämoglobinbestimmungen von Interesse sein dürften.

III. A n a l y s e n.

Ich werde mein Verfahren bei diesen Versuchen, da dasselbe von v. G ö t t s c h e l schon ausführlich beschrieben ist, nur kurz andeuten. Jede Blutabnahme (stets aus der vena jug. ext.) betrug etwa 50 Ccm. Zunächst wurden sofort nach dem Aderlaß mittelst einer Pipette 4—5 Ccm. in einen Platintiegel von bekanntem Gewicht und 15 Ccm. in ein Reagensglas, das nur wenig mehr faßte, übergeführt. Letzteres wurde zugestöpselt und zur Abscheidung des Serums bei Seite gestellt. Ersterer wurde mit seinem Inhalt gewogen und auf das Dampfbad gestellt (zur Bestimmung von T'), während dessen defibrinirte ein Gehilfe den Rest des Blutes; dann wurde das Gewicht des Blutes mit dem Faserstoff bestimmt, der Faserstoff herausgenommen, ausgepresst und zum Zwecke des Auswaschens bei Seite gestellt, von dem defibrinirten Blute 4—5 Ccm. zur Bestimmung des Rück-

standes (T) abgewogen und auch auf das Dampfbad gebracht, denn aus dem Hauptvorrath mittelst einer graduirten 1 Ccm. fassenden Pipette 0,32—0,34 Ccm. in das bereits erwähnte Glaskölbchen, in welchem sich eine gewogene Menge Co_2Na -Lösung von 0,023 % befand, gebracht (zur Bestimmung von ϵ), ein Pyknometer, welches nahezu 9 grm. Wasser faßte, gefüllt, beide gewogen, der Inhalt des Pyknometers zum übrigen zurückgegossen, von diesem weiter 20 Ccm. abgemessen, gewogen und in den Cylinder der Centrifuge übergeführt (zur Bestimmung von r). Das Serum erhielt ich aus dem Reagensglase nach eingetretener Contraction des Blutkuchens, was wenigstens 24 Stunden dauerte. Das Waschen der Blutkörperchen auf der Centrifuge fand wie bei v. G ö t f c h e l drei Mal statt; in der einen gewogenen Hälfte des in Wasser bis zum völligen Auflösen der Blutkörperchen aufgenommenen Sediments, wurde der Gehalt an SO_4Na_2 bestimmt, die andere Hälfte diente zur Bestimmung des Trockenrückstandes der Blutkörperchenlösung; das Gewicht desselben minus dem berechneten Gehalt an SO_4Na_2 ergab den Trockenrückstand der rothen Blutkörperchen.

Ich wich also in sofern von v. G ö t f c h e l ab, als ich die zur Ermittlung des Exstinctionscoefficienten in das Kölbchen übergeführte Blutquantität nicht volumetrisch, sondern durch Wägung bestimmte. Dividirt man das Gewicht der ganzen im Kölbchen enthaltenen verdünnten Blutlösung durch dasjenige des Blutes, so erhält man die Verdünnungszahl des letzteren. Nennt man diese Verdünnungszahl v und den Hämoglobingehalt in 100 grm. Blut h so ist $h = v \cdot \epsilon$. 0,1407, wobei die Zahl 0,1407 das von mir als richtig angenommene Absorptionsverhältniß des Hundehämoglobins bedeutet.

v. Goetschel bediente sich zum Waschen der Blutkörperchen des Schafes auf der Centrifuge einer SO_4Na_2 -Lösung von 1,5 ‰, bei dieser Concentration der Salzlösung war die über dem Sediment stehende Flüssigkeit völlig klar und hämoglobinfrei. In einer Reihe von Vorversuchen fand ich jedoch, daß man beim Hundeblut zum selben Ziel erst bei einer Concentration der Salzlösung von 2 ‰ gelangt; da auch eine 3 ‰ Salzlösung noch durchaus günstig wirkte, so wählte ich für meine weiteren Versuche eine Concentration von $2\frac{1}{2}$ ‰. Für das Pferdeblut fand ich die günstigste Concentration bei 1 ‰, denn dasselbe hatte bei $1\frac{1}{2}$ und noch mehr bei 2 ‰ Spuren von Hämoglobin an die Salzlösung abgegeben. Die Blutarten verhalten sich also in dieser Hinsicht verschieden.

Ferner beobachtete ich am Hundeblut, daß eine Senkung der rothen Blutkörperchen in den concentrirten Salzlösungen schneller von statten ging, als in den diluirteren. Die Differenz im spec. Gewicht der Blutkörperchen und der Salzlösung wächst also (wahrscheinlich nur bis zu einer gewissen Grenze) mit der Concentration der letzteren. Starke Contraction und Verdichtung der Blutkörperchen in den concentrirteren Salzlösungen wird wol der Grund dieser Erfahrung sein.

Meine Analysen haben einen so hohen Gehalt des gefunden Hundeblutes an rothen Blutkörperchen ergeben, nämlich 46,0 im ersten und 36,7 ‰ im zweiten Versuch, daß ich es nicht für überflüssig halte schon hier hervorzuheben, daß dasselbe sich auch zugleich durch ein außerordentlich hohes spec. Gewicht auszeichnet. Zum Beweise dessen stelle ich hier die Zahlen für einige von mir am Hunde- und Pferdeblut ausgeführten spec. Gewichtsbestimmungen zusammen, indem ich die entsprechenden aus v. Goetschel's

Arbeit entnommenen Zahlen für das Schafsblut, als dritte Reihe hinzufüge.

Specifisches Gewicht des

Hundeblutes	Pferdeblutes	Schafsblutes :
1061,3	1051,8	1053,1
1058,5	1050,6	1050,5
1061,0	1050,1	1049,3
1053,2	1049,6	1048,9
	1044,0	1044,7.

Die zwei letzten das Hundeblut betreffenden Zahlen sind den beiden später auszuführenden analytischen Versuchen entnommen. In dem zur fünften spec. Gewichtsbestimmung benutzten Pferdeblute wurden zugleich auch die Größen T, T', t und r bestimmt und darnach der Gehalt desselben an rothen Blutkörperchen (b) berechnet. Ich fand $b = 33,4$.

Im gefunden Schafsblut schwankt nach v. Goetschel's Angabe b zwischen 25,6 und 31,9.

T a b e l l e

Datum.	Nummer der Blutabnahme.	Zeit der Blutabnahme.	Prozent. Rückstand des detibrinirten Blutes (T.)	Prozent. Rückstand des Gesamtblutes (T')	Faserstoffprozent
21. Juli	I.	9 ^h 15'	21,939	21,688	0,104
„			³ / ₄ 10 ca. 10 Ccm. Jauche injicirt		
„	II.	12 ^h 30'	—	—	—
„	III.	3 ^h 15'	21,171	21,016	0,096
22. Juli	IV.	9 ^h 30'	20,548	20,394	0,249

Es folgen hier meine Versuche:

Verfuch I.

Hund von 14450 grm. Gewicht, $\frac{1}{2}$ Stunde nach der ersten Blutabnahme wurden 10 Ccm. Jauche injicirt. Da der Hund keine Krankheits Symptome zeigte folgte noch eine zweite Injection von 15 Ccm. Jauche eine Stunde nach der ersten. Die Wirkung der Injection war keine bedeutende, geringe Temperatursteigerung, wenig Dyspnoe, Erbrechen und einige breiige Stühle. Die Temperatur stieg von 40,4 bis 41,7. Eine Stunde nach der zweiten Jaucheinjection wurden 4 Ccm. Blut abgenommen, nur zur Bestimmung des Exstinctionscoefficienten. Die dritte Blutabnahme zur Bestimmung meiner zu berechnenden Werthe fand um $3\frac{1}{4}$ Nachmittags statt, die vierte am folgenden Morgen um $9\frac{1}{2}$. Es wurden jedesmal ca. 50 Ccm. entnommen. Der Hund hatte sich am folgenden Morgen vollkommen erholt, so dafs man äufserlich absolut keine Krankheits Symptome ihm anmerken konnte. Er frist und trinkt mit Appetit. Der Hund bleibt am Leben. Die Resultate stelle ich tabellarisch zusammen. Die Tabelle geht ihrer Länge wegen über S. 48 und 49.

-(T'—f).	Prozentischer Rückstand des Serum (t.)	Exstinctions- coefficient (ε).	Verdünnungs- zahl (v).	Rückstand der Blutkörperchen in 100 grm. Blut (r).
+ 0,355	8,237	0,90396	105,34	17,441
d um $11\frac{1}{2}$ 15 Ccm.				
—	—	1,09674	109,32	—
+ 0,251	7,649	0,94098	113,40	17,099
+ 0,403	7,637	0,90462	116,33	16,502

Corrigirt man nun die im vierten und letzten vertikalen Tabellenfabe enthaltenen Zahlen (T und r) so erhält man folgende Werthe für dieselben:

Tabelle B.

Nummer der Blutabnahme.	T	r
I	21,702	17,253
II	21,004	16,964
III	20,279	16,286

Die Zusammensetzung des Blutes findet man nun nach folgenden auf 100 grm. Blut bezogenen Formeln:

- 1) Gewicht der Blutkörperchen $= \frac{100 (t + r - T)}{t} = b$
- 2) Gewicht des Serum $= 100 - b$
- 3) Gewicht des Hämoglobins $= s. v. A = h$
- 4) Gewicht des Stroma $= r - h$
- 5) Gewicht des Serumrückstandes $= T - r$

Hieraus ergibt sich die nachfolgende Uebersicht über die Zusammensetzung des Blutes im vorliegenden Versuche. Der Vollständigkeit wegen setze ich die corrigirten Werthe für den Gesamtrückstand der rothen Blutkörperchen (r) auch in diese Tabelle, zugleich füge ich die Angaben über das spezifische Gewicht des Blutes hinzu.

In 100 grm. defibrinirten Blutes sind enthalten:

Tabelle C.

Nummer der Blutproben.	Blutkörperchen.	Serum.	Gesamtrückstand d. rothen Blutkörperchen.	Hämoglobin.	Stroma.	Serumrückstand.	Spec. Gew.
I.	45,987	54,013	17,253	13,398	3,855	4,462	1061,0
II.	—	—	—	16,869	—	—	—
III.	47,183	52,817	16,964	15,014	1,950	4,040	1059,0
IV.	47,715	52,285	16,286	14,806	1,480	3,993	1057,5

Das Blutkörperchenprocent zeigt zwar ein fortschreitendes Wachsthum, aber ihr Gesammtrückstand (r) nimmt nicht bloß relativ, sondern auch absolut ab, ebenso der Rückstand des Serum, woraus sich die wachsende Abnahme des spec. Gewichts erklärt. Unter diesen Umständen kommt die absolute Zunahme, welche der eine Bestandtheil des Gesammtrückstandes der rothen Blutkörperchen, das Hämoglobin, in Blutprobe III und IV gegenüber Blutprobe I zeigt, im spec. Gewicht des Blutes nicht zum Ausdruck. In der zweiten, etwa eine Stunde nach der Injection abgenommenen Blutprobe, bemerken wir eine beträchtliche Zunahme des Hämoglobins, aber es fehlen hier alle übrigen Daten. Auch Göttschel und Mobitz fanden, daß die durch die Injection bewirkte Blutveränderung mit einer sehr bald eintretenden Erhöhung des Extinctionscoefficienten, also mit einer Zunahme des Hämoglobingehaltes beginnt. Zu denselben Resultaten in Betreff der Blutkörperchen selbst gelangten Maifurianz ¹⁾ und Heyl ²⁾ auf dem Wege ihrer Zählungen.

Die Zusammensetzung der rothen Blutkörperchen ergibt sich aus der folgenden Ueberschrift:

Tabelle D.

In 100 gramm. rother Blutkörperchen sind enthalten:

Nr. d. Blutprobe.	Gesammtrückstand.	Hämoglobin.	Stroma.
I	37,517	29,135	8,382
III	35,954	31,820	4,134
IV	34,132	31,030	3,102.

1) Inauguraldissertation. Dorpat 1882. pag. 37.

2) Inauguraldissertation. Dorpat 1882. pag. 60.

Tabelle E.

100 grm. Blutkörperchenrückstand bestehen aus:

Nr. d. Blutabnahme.	Hämoglobin.	Stroma.
I	77,656	22,344
III	88,502	11,498
IV	90,912	9,088.

Beim Ueberblicken dieser Tabellen sehen wir, daß das Blut nach stattgehabter Injection von Jauche im Wesentlichen dieselben Veränderungen zeigt, wie sie v. Goetschel unter denselben Umständen bei Schafen beobachtete, nur sind sie, entsprechend dem sehr wenig gestörten Wohlbefinden des Thieres, bei weitem nicht so ausgeprägt, wie in v. Goetschels Versuchen, namentlich in seinem Versuch V, in welchem schon $6\frac{1}{2}$ Stunden nach der Injection der Tod eintrat. Der Oxyhämoglobingehalt steigt nach der Injection rasch an (um 25 %), um dann wieder zu sinken, er steht aber auch noch am folgenden Tage über der Norm (um 10,5 %), das Blutkörperchenprozent zeigt eine stetige, aber nicht bedeutende Zunahme (von Blutprobe I bis IV nur um 4,1 %). Während so das Blutkörperchenprozent steigt, nimmt die Concentration des Serum (t) nicht zu, sondern ab. Die Concentration der Blutkörperchen nimmt, während sie sich vermehren, ab und zwar nicht bloß relativ, sondern auch absolut, wie die Zahlen im vierten vertikalen Stabe der Tabelle C und im zweiten der Tab. D. zeigen. Indem aber der Gesamtrückstand der Blutkörperchen sich vermindert, zeigt der eine Bestandtheil desselben, das Oxyhämoglobin, die schon erwähnte Wachsthumcurve (Tab. C, D u. E), so daß die Abnahme des ersteren ganz auf Rechnung des Stroma kommt, dessen ursprüngliches Verhältniß zum Oxyhämoglobin sehr deutlich gestört erscheint (Tab. E).

Auch hier sehen wir also in Folge der Injection nicht bloß die Menge der Blutkörperchen, sondern auch ihre Zusammensetzung sich ändern. Die Annahme einer bloß relativen Vermehrung der Blutkörperchen durch gesteigerte Transsudation im Organismus, reicht also zur Erklärung der Erscheinungen nicht aus, ganz abgesehen davon, daß ein solcher Vorgang mit viel mehr Wahrscheinlichkeit die Concentration der Blutflüssigkeit erhöhen, als erniedrigen würde. Betrachten wir nun die zur ersten, vor der Injection abgenommenen Blutprobe gehörenden Zahlen, die uns also die Verhältnisse im gefundenen Blute ausdrücken, so fällt zweierlei auf, das hohe Blutkörperchenprozent und der Reichthum der Blutkörperchen am Stroma.

In ersterer Beziehung habe ich schon auf das hohe spec. Gewicht des Hundebldes hingewiesen. Man beachte ferner, wie hoch sämmtliche Zahlen im Vergleich mit den entsprechenden von v. Göttschel am Schafblut ermittelten sind. Der Trockenrückstand des defibrinirten Bldes (ohne Correctur) schwankt bei v. Goetschel (mit Bezug auf das gesunde Blut) zwischen 15,05 und 17,05 %, während er in unserem Versuche sich auf 21,939 beläuft. Der Trockenrückstand der rothen Blutkörperchen in 100 grm. bewegt sich dort zwischen den Grenzen 9,47 und 12,35, hier beträgt er 17,44; den Serumrückstand des Hundebldes endlich finden wir nicht kleiner, sondern ganz entsprechend den beim Schafsbld gefundenen Zahlen. Zur Vervollständigung des Vergleiches führe ich hier zugleich die Ergebnisse einer bereits kurz erwähnten Analyse vom Pferdeblut an. Die spectrophotometrischen Bestimmungen fielen bei diesen Versuchen weg. Da auch die Faserstoffbestimmung unterblieb, so konnten T und r nicht in gewöhnlicher Weise corrigirt

werden, weshalb die berechneten Werthe von b etwas zu klein und von r etwas zu groß sind.

Prozentischer Rückstand des defibrinirten Blutes	17,236
Rückstand der rothen Blutkörperchen in 100 grm. Blut	12,538
Prozentischer Rückstand des Blutserums	7,049
Specifisches Gewicht des Blutes	1049,6

Hieraus ergibt sich:

das Blutkörperchenprozent	33,351
Rückstand der rothen Blutkörperchen	37,594

Man sieht, wie klein die Wägungsrückstände dieses Blutes verglichen mit denen des Hundebutes sind; absolut und relativ am größten ist dieser Unterschied beim Rückstand der rothen Blutkörperchen (r), was ganz dem Unterschied im berechneten Blutkörperchenprozent entspricht, da der prozentische Rückstand der rothen Blutkörperchen selbst (R) mit dem entsprechenden beim Hundebut gefundenen Werthe fast genau übereinstimmt. In drei andern Versuchen habe ich auch den Exstinctionscoefficienten beim Blute verschiedener Pferde bestimmt.

Ich fand:

Nummer des Pferdes.	ϵ .	v .	spec. Gew.
I	0,65584	110,84	—
II	0,61488	116,94	1044,0
III	0,64268	115,18	1051,8

Zur Berechnung des Oxyhämoglobingehaltes mittelst dieser Exstinctionscoefficienten benutzte ich gleichfalls das im 2 Mal krystallisirten Pferdeblute erhaltene Absorptionsverhältniß = 0,1565. Ich erinnere daran, daß die Berechnung mit dieser Zahl jedenfalls einen kleineren Fehler mit sich bringt, da ich das Absorptionsverhältniß des Pferdeblutes nicht ganz genau in der Spectralregion bestimmte, in welcher ich später arbeitete,

die um ein Geringes dem violetten Ende näher lag. Doch wird dieser Fehler ein sehr unbedeutender sein.

Die Berechnung ergibt nun für den Procentgehalt des Pferdeblutes an Oxyhämoglobin in

Versuch I.	11,377
„ II.	11,253
„ III.	11,588

Man sieht, daß auch diese Werthe beträchtlich hinter dem entsprechenden im Hundeblute gefundenen zurückbleiben (Tab. C. Stab 5).

Mit Rücksicht auf den großen Stromareichthum in der ersten Blutprobe könnte man auf den Gedanken kommen, die betreffende Zahl hätte diese Höhe erreicht, weil ich die kleinere von mir gefundene Zahl für das Absorptionsverhältniß des Hundehämoglobins bei Berechnung desselben benutzt und deshalb eine zu kleine Zahl für das Oxyhämoglobinprocent erhalten habe. Ich habe darum die Rechnung für alle drei Blutproben wiederholt mit dem größeren Werth des Absorptionsverhältnisses (0,1493) und bin dabei zu folgender Zusammensetzung des Blutkörperchenrückstandes gelangt. 100 grm. Blut bestehen aus:

Nr. d. Blutprobe.	Hämoglobin.	Stroma.
I	82,402	17,598
II	93,911	6,089
III	96,469	3,531.

Bei dieser Berechnung fällt das Stromaprocent in allen drei Blutproben um ca. 5 % niedriger aus, als wir es früher gefunden (Tab. E); grade für die erste Blutprobe macht diese Veränderung aber verhältnißmäßig wenig aus, während die entsprechenden Zahlen der zweiten und besonders der dritten Blutprobe nun wieder auffallend klein erscheinen, doch könnte man dies auf die krankhafte Veränderung dieser bei-

den Blutproben beziehen. Entscheidend für meine Wahl des Absorptionsverhältnisses waren nicht die Resultate dieses Versuches, sondern, abgesehen von den bereits angeführten Gründen, die des nächstfolgenden.

Uebrigens läßt sich aus v. Goetschel's Versuchen entnehmen, daß auch bei Schafen ein großer Stromareichthum der rothen Blutkörperchen vorkommt und zwar jedenfalls ein viel größerer als wir ihn hier beim Hunde beobachtet haben. Man überblicke folgende Zahlen, welche sich sämmtliche auf das vor der Jaucheinjection abgenommene Blut seiner fünf Thiere beziehen und behalte dabei im Auge, daß der Oxyhämoglobingehalt des Blutes seinem Exstinctionscoefficienten proportional ist. Da v. Goetschel stets in einer und derselben Region des Spektrums gearbeitet hat und der Verdünnungsgrad des Blutes gleichfalls immer der gleiche war (141,056), so sind die Exstinctionscoefficienten des Blutes der verschiedenen Thiere unter einander vergleichbar. Die Nummern in der Tabelle entsprechen denen der v. Goetschel'schen Arbeit, ich habe sie nur anders geordnet. Die Exstinctionscoefficienten gebe ich dreistellig

Nr. d. Thiers.	Rückstand d. roth. Blutk. in 100 grm. Blut.	
V.	12,047	0,549
I.	11,308	0,516
III.	10,903	0,487
II.	9,374	0,395
IV.	10,983	0,315.

Man sieht, daß in den drei oberen Querstäben der Tabelle zwischen dem gesammten Blutkörperchenrückstand und dem Exstinctionscoefficienten eine fast genaue Proportionalität besteht; etwas zu Ungunsten des Exstinctionscoefficienten gestört erscheint sie schon im vierten Querstabe, vielmehr aber im letzten. Im Versuche V und III sind die

Werthe des Blutkörperchenrückstandes fast gleich. Nehmen wir nun an, daß im Versuch III die Blutkörperchen so arm an Strome gewesen, daß dasselbe ganz vernachlässigt worden und der Blutkörperchenrückstand als nur aus Hämoglobin bestehend angesehen werden dürfte und demnach der Extinctionscoefficient 0,487 einem Hämoglobingewicht von 10,903 entspräche, so ergibt sich für den Versuch V, in welchem der Extinctionscoefficient 0,315 war ein Hämoglobingewicht von 7,052. Der Gesammtrückstand der Blutkörperchen in diesem Versuch beträgt aber 10,983 grm, er besteht also aus 64,2 % Oxyhämoglobin und 35,8 % Stroma. Da nun aber ganz sicher ist, daß die Hämoglobinziffer in Versuch III. kleiner als 10,903 ist, so können wir auch mit absoluter Sicherheit behaupten, daß der Rückstand der Schafblutkörperchen im Versuch V. aus mehr als 35,8 % Stroma und weniger als 64,2 % Hämoglobin bestanden habe.

Es war gerade das im Versuch V. benutzte Schaf, welches schon 6½ Stunden nach der Injection zu Grunde ging; vielleicht hing die geringe Widerstandsfähigkeit des Thieres eben mit der Hämoglobinararmuth seiner Blutkörperchen zusammen.

Verfuch II.

Hund 24,000 grm. Gewicht um 10½ Uhr morgens findet die erste Blutabnahme statt, 12¼^h werden 30 Ccm. Jauche injicirt, da dieselben bis 2 Uhr nachmittags absolut keine Krankheitsymptome bewirkten, wurden noch 40 Ccm Jauche injicirt, um 2½ Uhr ist die Athmung beschleunigt, die Temperatur steigt von 39,6° bis 40°. Um 3 Uhr nachmittags hat die Temperatur eine Höhe von 41,3 erreicht, das Thier zittert ein wenig, sonst keine Erscheinungen von Krankheit. 4^h 15' ist die Temperatur 41,4°. Es folgt die zweite Blutabnahme. Am nächsten Morgen

erscheint das Thier ganz gesund, die Temperatur $40,1^{\circ}$, um $8^h 40'$ findet die dritte Blutabnahme statt, das Thier bleibt am Leben. Auch diese Tabelle geht über beide vorliegende Seiten.

Tabelle

Datum	Nr. der Blutabnahme.	Zeit der Blutabnahme	Proz. Rückstand des defibrinirten Blutes (T.)	Proz. Rückstand des Gesamtblutes (T.)
I	12/VIII	$10^h 30'$	18,898	18,799
12 ^h 15 Injection von 30 Ccm.				
II	12/VIII	$4^h 15'$	19,381	19,295
III	13/VIII	$8^h 40'$	17,814	17,749

Tabelle B.

Corrigirte Werthe von T und r.

Nummer der Blutprobe	T.	r.
I	18,634	13,714
II	19,195	14,711
III	17,555	12,981

Tabelle C.

Im 100 grm. defibrinirten Blutes sind enthalten:

Nummer der Blutproben.	Blutkörperchen.	Serum.	Gesamtrückstand d. rothen Blutkörperchen.	Hämoglobin.	Stroma.	Serumrückstand.	Spec. Gew.
I.	36,704	63,294	13,714	14,097	0,383	4,920	1053,2
II.	37,108	62,892	14,711	14,258	0,453	4,483	1054,5
III.	33,825	66,175	12,981	12,837	0,124	4,574	1050,5

Wie auch dieses Thier nur unbedeutende Krankheits-symptome darbot, so findet man auch in der Zusammensetzung der drei Blutproben kaum mehr, als blofse Andeutungen einer durch die Injection gesetzten Störung. Wir erkennen an den drei Hauptwerthen im Blute, an der Ziffer

für das Blutkörperchengewicht, für den Gefammtrückstand der Blutkörperchen, und für das Oxyhämoglobin, die gewöhnlichen Curven; doch ist überall der später abfinkende

Sauerstoff % (f).	T—(T'—f)	pro Rück- stand des Blutserum (t).	ϵ .	Verdün- nungs- zahl (v).	Rückstand der Blutkörperchen in 100 Gramm Blut.
0,297	0,396	7,773	0,88872	112,74	13,914
Auche 2 ^h von 40 Ccm.					
0,193	0,279	7,129	0,92636	112,64	14,854
0,324	0,389	6,912	0,79812	114,49	13,229

Theil dieser Curven viel stärker ausgeprägt als der ansteigende. Es ist sehr möglich, daß zwischen der Injection und der zweiten Blutabnahme die genannten drei Blutbestandtheile höhere Werthe darstellten, als wir sie beobachtet haben. Der Serumrückstand nimmt nach der Injection wie im Versuch I ab. Die Aenderungen des spec. Gewichtes entsprechen denjenigen dieser drei Blutbestandtheile. Die Zunahme des spec. Gewichtes der zweiten Blutprobe scheint freilich zu groß zu sein für den geringen Zuwachs an Hämoglobin, aber es ist hierbei zu berücksichtigen, daß der Gesamtrückstand der rothen Blutkörperchen viel mehr gewachsen ist, als das Hämoglobin.

Auf das unmögliche Ergebniss, daß in der ersten Blutprobe die Ziffer des Hämoglobin höher ausfällt, als diejenige des Blutkörperchenrückstandes, komme ich später zurück.

Tabelle D.

In 100 grm. rother Blutkörperchen sind enthalten.

Nr. der Blutprobe.	Gesamtrück.	Hämoglob.	Stroma.
I	37,364	38,407	—1,043
II	39,644	38,423	1,221
III	38,377	38,010	0,367

Tabelle E.

100 grm. Blutkörperchenrückstand bestehen aus:

Nr. der Blutprobe.	Hämogl.	Stroma.
I	102,791	— 2,791
II	96,920	3,080
III	99,044	0,056

Dieser Versuch ergibt also für die Blutprobe I. eine unmögliche Zusammensetzung des Blutkörperchenrückstandes, für die Blutprobe II und III eine mindestens unwahrscheinliche, da auch hier der Blutkörperchenrückstand fast ganz aus Oxyhämoglobin bestehen würde. Mit Berücksichtigung dieser Unwahrscheinlichkeit fände sich demnach ein und derselbe Fehler in allen drei Blutproben. Schon diese Constanz desselben erweckt den Verdacht gegen die einzige Constante, die wir bei unseren Rechnungen benutzt haben, nämlich gegen das von uns gefundene Absorptionsverhältniß. Wir wollen indess auch noch andere Möglichkeiten ins Auge fassen.

Es giebt zunächst nur zwei Möglichkeiten: 1) der Werth für den Gesamtrückstand der Blutkörperchen ist zu niedrig. 2) die Oxyhämoglobinbestimmung ist zu hoch ausgefallen. Beide Werthe sind ganz unabhängig von einander und von den übrigen Werthen bestimmt worden, der erstere mittelst Waschen der Blutkörperchen auf der Centrifuge, der zweite spectrokopisch.

Ad p. 1 Ein Wägungsfehler bei Bestimmung des Rückstandes der gewaschenen und getrockneten Blutkörperchen könnte zunächst auf mangelhaftem Trocknen beruhen; dadurch aber würde derselbe einen zu hohen und nicht einen zu geringen Werth erhalten. Dasselbe gilt von einem zweiten möglichen Wägungsfehler, nämlich der Bestimmung des

im Blutkörperchensediment enthaltenen Na_2SO_4 , welches von dem Rückstande dieses Sediments abgezogen wird.

Alle zu dieser Bestimmung erforderlichen Manipulationen, wie das Extrahiren des Salzes aus der coagulirten Blutkörperchenlösung, das Ueberführen in BaSO_4 , das Abfiltriren dieses feinvertheilten und die Filtra leicht passirenden Salzes sind derart, daß nur Verluste zu befürchten sind. Die Salzbestimmung würde also, sofern von einem merkbaren Fehler hierbei überhaupt die Rede sein kann, zu niedrig ausfallen und eben deshalb die Rückstandsbestimmung zu hoch. Andere zufällige Wägungsfehler, wie etwa Verluste durch Verschütten u. dergl. sind nicht vorgekommen.

Aber der Rückstand der rothen Blutkörperchen konnte dadurch zu klein ausgefallen sein, daß dieselben beim Waschen auf der Centrifuge Substanzverluste an die Waschflüssigkeit erlitten haben; da dieselbe aber keine Spur von Hämoglobin enthielt, so mußte sie Stromabestandtheile den Blutkörperchen entzogen haben, während doch das leicht lösliche Hämoglobin in den Blutkörperchen zurückblieb.

Wir haben das Hämoglobinprozent in der ersten Blutprobe dieses Versuches = 14,097, den Gesamtrückstand der Blutkörperchen aber, mit der Korrektur nur = 13,714 % gefunden. Unter der Voraussetzung die Blutkörperchen hätten Stromaverlust auf der Centrifuge erlitten, während die Oxyhämoglobinbestimmung richtig war, wollen wir annehmen, das Oxyhämoglobin habe thatsächlich 90 resp. nach einer zweiten Annahme, es habe 95 % des ganzen Blutkörperchenrückstandes betragen. Die richtige Ziffer für den Prozentgehalt des Blutes an festen Blutkörperchenbestandtheilen (r) wäre alsdann, wenn wir von der in der ersten Blutprobe gefundenen Hämoglobinziffer, nämlich 14,097 ausgehen in diesen beiden Fällen 15,66 resp. 14,83. Berechnen wir nun

mit diesen Werthen von r in Verbindung mit den beiden übrigen unabhängig davon ermittelten Wägungsergebnissen T u. f das Blutkörperchenprozent (b) und den Rückstand von 100 grm. Blutkörperchen (R), so gelangen wir zu höchst unwahrscheinlichen Ergebnissen. Wir finden nämlich immer unter der Voraussetzung der Richtigkeit der Oxyhämoglobinbestimmung, im ersten Fall, wenn der Blutkörperchenrückstand aus 90 % Hämoglobin und 10 % Stroma bestand

$$b = 61,69$$

$$R = 25,38$$

im zweiten Fall, wenn der Blutkörperchenrückstand aus 95 % Hämoglobin und 5 % Stroma bestand

$$b = 51,09$$

$$R = 29,38$$

Selbst unter der Annahme also, daß der Blutkörperchenrückstand nur 5 % Stroma enthalten habe, gelangen wir zu unwahrscheinlichen Resultaten, sobald wir von der Voraussetzung ausgehen, der Fehler unserer Analyse beruhe auf einem Verlust an diesen 5 % Stroma während des Auswaschens der Blutkörperchen.

Wie man es unserer Hauptformel sogleich ansieht, müßte man, um bei der obigen Rechnung zu annehmbaren Werthen von b und R zu gelangen, auch für den Gesamtrückstand des Blutes (T) eine entsprechende Erhöhung eintreten lassen, d. h. man müßte annehmen, daß in diesem Versuch nicht bloß der Werth r , sondern nebenbei auch noch der Werth T , dessen Bestimmung auf eine so einfache Procedur beruht, verunglückt ist. Ich mache ferner darauf aufmerksam, daß das spec. Gewicht des Blutes in unserem ersten Versuch 1061,0 und im zweiten 1053,2 betrug. Dieser großen Gewichts-differenz muß um so mehr eine große Differenz im Blutkörperchenrückstand entsprechen, als die

Concentration des Serums in beiden Versuchen fast die gleiche war.

Ad p. 2. Eine grössere Wahrscheinlichkeit behält demnach die Annahme, daß das Hämoglobinprozent des Blutes zu hoch bestimmt ist. Dafür daß in der Gleichung $h = v \cdot \varepsilon \cdot A$ die Werthe v und ε richtig bestimmt worden sind, kann ich einstehe; es wäre auch geradezu wunderbar, wenn ein etwaiger Fehler in dieser Hinsicht sich durch alle Blutproben eines und desselben Versuches wiederholt hätte. Wohl aber spricht diese Constanz des Fehlers, wie ich bereits hervorgehoben habe, dafür, daß der Werth A unrichtig und zwar zu hoch ist, wobei noch besonders zu bemerken ist, daß die Annahme eines Fehlers im Werthe A zur Erklärung ausreicht, ohne daß irgend einer der andern von mir ermittelten Werthe in Mitleidenschaft gezogen würde; dazu kommen noch die für diese Annahme im zweiten Abschnitt dieser Arbeit bereits erwähnten Gründe. Es ist dabei immerhin möglich, daß wir es im vorliegenden Fall mit sehr stromaarmen Blutkörperchen zu thun gehabt haben und daß gerade in diesem Umfande der Grund dafür gegeben ist, daß der supponirte Fehler der Constanten A für die Blutprobe I dieses Versuches sogar zu einem absolut unmöglichen Resultat geführt hat. In Anbetracht der Frage, um wie viel der von uns gefundene Werth von A zu hoch gefunden ist, kann natürlich nichts gesagt werden, als daß es sich wahrscheinlich um eine geringe Differenz handelt, nur soviel ist klar, daß, wenn meine Annahme richtig ist und der wahre Werth von A niedriger ist, als ich ihn gefunden, daß dann auch das Stromaprozent in der ersten Blutprobe des Versuches I mit 22,591 % des Gesamtrückstandes der rothen Blutkörperchen noch zu niedrig berechnet worden ist. Meine Versuche würden demnach

ebenso wie die von v. Göttschel beweisen, daß der Stromagehalt der Blutkörperchen bei verschiedenen Individuen, der von uns untersuchten Thierarten innerhalb weiter Grenzen schwankt und ich wüßte keine sicher fundirte Thatfache, welche dieses Resultat unmöglich erscheinen liefse. Es erscheint vielmehr durchaus möglich, daß ähnliche Differenzen im Stromagehalt der Blutkörperchen, wie wir sie bei verschiedenen Individuen beobachtet haben im Laufe der Zeit auch innerhalb eines und desselben Individuums Platz greifen.

Zum Schlufs will ich noch hervorheben, daß die unbedeutenden Veränderungen des Blutes in meinen Versuchen der geringen Gesundheitsstörung der betreffenden Thiere entspricht.

Dorpat, physiol. Institut 1./13. Oct. 1884.

Thesen.

1. Blutuntersuchungen mit dem Spectrophotometer müssen gleich nach Anfertigung des Präparates gemacht werden.
 2. Bei Blutungen nach der Geburt sollten die heißen Douchen den kalten vorgezogen werden.
 3. Die Hebeammen sollen in der strengsten Antisepsis unterwiesen werden.
 4. Die acute Gonorrhoe soll in der ersten Zeit nicht mit Injectionen behandelt werden.
 5. Der Alcohol gehört zu den schädlichsten Giften.
 6. Tod bei Verbrühung beruht auf Hämoglobinvergiftung.
-

